

表 303 2015年死亡患者死亡原因分類(年齢別, 原疾患別)原疾患＝慢性腎盂腎炎

死因	5歳未満	5歳～	10歳～	15歳～	20歳～	25歳～	30歳～	35歳～	40歳～	45歳～	50歳～	55歳～	60歳～	65歳～	70歳～	75歳～	80歳～	85歳～	90歳～	95歳～	合計	不明	記載なし	総計	平均	標準偏差
心不全 (%)										1 (20.0)	1 (50.0)		5 (29.4)	2 (8.0)	8 (20.5)	11 (25.6)	10 (18.2)	13 (34.2)	8 (44.4)		59 (22.8)			59 (22.8)	78.76	10.35
脳血管障害 (%)													3 (17.6)	1 (4.0)	3 (7.7)		5 (9.1)	3 (7.9)	1 (5.6)		16 (6.2)			16 (6.2)	76.75	9.94
感染症 (%)					2 (100.0)				1 (25.0)	1 (20.0)	1 (50.0)	1 (25.0)	3 (17.6)	8 (32.0)	6 (15.4)	14 (32.6)	13 (23.6)	11 (28.9)	2 (11.1)		63 (24.3)			63 (24.3)	74.13	14.20
消化管出血 (%)															1 (2.6)		1 (1.8)				2 (0.8)			2 (0.8)	77.00	9.90
悪性腫瘍 (%)									3 (75.0)	1 (20.0)		2 (50.0)	3 (17.6)	4 (16.0)	10 (25.6)	8 (18.6)	7 (12.7)	2 (5.3)	2 (11.1)		42 (16.2)			42 (16.2)	71.57	12.66
悪液質/尿毒症 (%)										1 (20.0)				1 (4.0)	4 (10.3)		2 (3.6)	2 (5.3)	1 (5.6)	2 (40.0)	13 (5.0)			13 (5.0)	79.69	13.47
心筋梗塞 (%)														1 (4.0)	2 (5.1)	1 (2.3)	2 (3.6)	2 (5.3)		8 (3.1)			8 (3.1)	77.50	6.89	
カリウム中毒/頓死 (%)															2 (5.1)	1 (2.3)				3 (1.2)			3 (1.2)	74.00	3.00	
肝硬変症 (%)														1 (4.0)		1 (2.3)				2 (0.8)			2 (0.8)	70.00	7.07	
自殺/拒否 (%)																										
腸閉塞 (%)					1 (100.0)					1 (20.0)			1 (5.9)	1 (4.0)		1 (2.3)	2 (3.6)				7 (2.7)			7 (2.7)	63.43	19.16
肺血栓/肺塞栓 (%)																										
災害・事故死 (%)																1 (2.3)					1 (0.4)			1 (0.4)	79.00	
その他 (%)								1 (100.0)						1 (4.0)	1 (2.6)	2 (4.7)	7 (12.7)	3 (7.9)	3 (16.7)	2 (40.0)	20 (7.7)			20 (7.7)	81.65	12.90
不明 (%)												1 (25.0)	2 (11.8)	5 (20.0)	2 (5.1)	3 (7.0)	6 (10.9)	2 (5.3)	1 (5.6)	1 (20.0)	23 (8.9)			23 (8.9)	76.26	10.04
合計 (%)					2 (100.0)	1 (100.0)		1 (100.0)	4 (100.0)	5 (100.0)	2 (100.0)	4 (100.0)	17 (100.0)	25 (100.0)	39 (100.0)	43 (100.0)	55 (100.0)	38 (100.0)	18 (100.0)	5 (100.0)	259 (100.0)			259 (100.0)	75.80	12.54
記載なし																										
総計					2	1		1	4	5	2	4	17	25	39	43	55	38	18	5	259			259	75.80	12.54

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査