

表 304 2015年死亡患者死亡原因分類(年齢別, 原疾患別)原疾患＝急速進行性糸球体腎炎

死因	5歳未満	5歳～	10歳～	15歳～	20歳～	25歳～	30歳～	35歳～	40歳～	45歳～	50歳～	55歳～	60歳～	65歳～	70歳～	75歳～	80歳～	85歳～	90歳～	95歳～	合計	不明	記載なし	総計	平均	標準偏差
心不全 (%)											1 (20.0)		3 (33.3)	4 (12.1)	13 (21.3)	17 (26.6)	19 (26.4)	9 (15.0)	7 (25.9)	2 (66.7)	75 (21.8)			75 (21.8)	79.15	8.86
脳血管障害 (%)								1 (50.0)				2 (28.6)		2 (6.1)	4 (6.6)	2 (3.1)	4 (5.6)	4 (6.7)	1 (3.7)		20 (5.8)			20 (5.8)	74.65	12.69
感染症 (%)							1 (100.0)	1 (50.0)				2 (28.6)	2 (22.2)	14 (42.4)	22 (36.1)	25 (39.1)	24 (33.3)	19 (31.7)	6 (22.2)	1 (33.3)	117 (34.0)			117 (34.0)	77.03	9.60
消化管出血 (%)															2 (3.3)	1 (1.6)	3 (4.2)				6 (1.7)			6 (1.7)	78.17	4.71
悪性腫瘍 (%)													1 (11.1)	6 (18.2)	6 (9.8)	6 (9.4)	3 (4.2)	3 (5.0)	2 (7.4)		27 (7.8)			27 (7.8)	75.48	8.27
悪液質/尿毒症 (%)												1 (14.3)			2 (3.3)	2 (3.1)	4 (5.6)	9 (15.0)	3 (11.1)		21 (6.1)			21 (6.1)	83.14	8.06
心筋梗塞 (%)														1 (3.0)	2 (3.3)		4 (5.6)		2 (7.4)		9 (2.6)			9 (2.6)	80.44	9.04
カリウム中毒/頓死 (%)											1 (20.0)		1 (11.1)	1 (3.0)	1 (1.6)	1 (1.6)		2 (3.3)			7 (2.0)			7 (2.0)	72.86	12.95
肝硬変症 (%)											2 (40.0)	1 (14.3)		1 (3.0)							4 (1.2)			4 (1.2)	56.75	6.55
自殺/拒否 (%)													1 (11.1)								1 (0.3)			1 (0.3)	63.00	
腸閉塞 (%)														1 (3.0)			1 (1.4)	1 (1.7)			3 (0.9)			3 (0.9)	78.00	11.14
肺血栓/肺塞栓 (%)															1 (1.6)						1 (0.3)			1 (0.3)	73.00	
災害・事故死 (%)																										
その他 (%)												1 (14.3)		1 (3.0)	2 (3.3)	7 (10.9)	5 (6.9)	6 (10.0)	5 (18.5)		27 (7.8)			27 (7.8)	81.52	8.22
不明 (%)											1 (20.0)		1 (11.1)	2 (6.1)	6 (9.8)	3 (4.7)	5 (6.9)	7 (11.7)	1 (3.7)		26 (7.6)			26 (7.6)	77.77	8.98
合計 (%)							1 (100.0)	2 (100.0)			5 (100.0)	7 (100.0)	9 (100.0)	33 (100.0)	61 (100.0)	64 (100.0)	72 (100.0)	60 (100.0)	27 (100.0)	3 (100.0)	344 (100.0)			344 (100.0)	77.76	9.71
記載なし																										
総計							1	2			5	7	9	33	61	64	72	60	27	3	344			344	77.76	9.71

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査