

表 305 2015年死亡患者死亡原因分類(年齢別、原疾患別)原疾患=妊娠腎／妊娠中毒症

死因	5歳未満	5歳～	10歳～	15歳～	20歳～	25歳～	30歳～	35歳～	40歳～	45歳～	50歳～	55歳～	60歳～	65歳～	70歳～	75歳～	80歳～	85歳～	90歳～	95歳～	合計	不明	記載なし	総計	平均	標準偏差	
心不全 (%)											2 (25.0)	5 (31.3)	5 (35.7)	4 (22.2)	4 (25.0)						20 (26.0)			20 (26.0)	73.20	6.50	
脳血管障害 (%)											2 (25.0)	2 (12.5)	3 (21.4)	1 (5.6)	3 (18.8)						11 (14.3)			11 (14.3)	71.82	7.80	
感染症 (%)											1 (100.0)	1 (100.0)	2 (25.0)	1 (6.3)	3 (21.4)	6 (33.3)	3 (18.8)					17 (22.1)			17 (22.1)	72.12	9.41
消化管出血 (%)											2 (25.0)	1 (6.3)	1 (7.1)		1 (6.3)						5 (6.5)			5 (6.5)	68.80	8.23	
悪性腫瘍 (%)														1 (5.6)	1 (6.3)						2 (2.6)			2 (2.6)	78.50	3.54	
悪液質/尿毒症 (%)														1 (5.6)	1 (6.3)						2 (2.6)			2 (2.6)	80.00	4.24	
心筋梗塞 (%)														1 (6.3)	1 (5.6)						2 (2.6)			2 (2.6)	72.00	5.66	
カリウム中毒/頓死 (%)														2 (12.5)	2 (11.1)	1 (100.0)					5 (6.5)			5 (6.5)	75.20	9.04	
肝硬変症 (%)																											
自殺/拒否 (%)																											
腸閉塞 (%)																					1 (1.3)			1 (1.3)	80.00		
肺血栓/肺塞栓 (%)																											
災害・事故死 (%)														1 (7.1)							1 (1.3)			1 (1.3)	71.00		
その他 (%)														1 (7.1)	2 (11.1)						5 (6.5)			5 (6.5)	82.00	10.12	
不明 (%)														4 (25.0)							6 (7.8)			6 (7.8)	70.83	7.94	
合計 (%)											1 (100.0)	1 (100.0)	8 (100.0)	16 (100.0)	14 (100.0)	18 (100.0)	16 (100.0)	1 (100.0)	2 (100.0)	77 (100.0)				77 (100.0)	73.34	8.10	
記載なし																											
総計											1	1	8	16	14	18	16	1	2	77			77	73.34	8.10		

数値下のカッコ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査