

表 306 2015年死亡患者死亡原因分類(年齢別, 原疾患別)原疾患=その他分類不能の腎炎

| 死因 | 5歳未満 | 5歳～ | 10歳～ | 15歳～ | 20歳～ | 25歳～ | 30歳～ | 35歳～ | 40歳～ | 45歳～ | 50歳～ | 55歳～ | 60歳～ | 65歳～ | 70歳～ | 75歳～ | 80歳～ | 85歳～ | 90歳～ | 95歳～ | 合計 | 不明 | 記載なし | 総計 | 平均 | 標準偏差 |
|------------------|------|-----|------|------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|----|------|---------------|-------|-------|
| 心不全 (%) | | | | | | | | | | 1 (50.0) | | | 1 (33.3) | | 1 (20.0) | 4 (21.1) | 3 (20.0) | 4 (28.6) | 1 (20.0) | | 15 (18.1) | | | 15 (18.1) | 78.33 | 12.12 |
| 脳血管障害 (%) | | | | | | | | | | | | | 1 (33.3) | | 1 (5.3) | 1 (6.7) | | | | 1 (33.3) | 4 (4.8) | | | 4 (4.8) | 81.25 | 14.86 |
| 感染症 (%) | | | | | | | | 1 (100.0) | | | 1 (100.0) | 1 (50.0) | 1 (33.3) | 1 (8.3) | 3 (60.0) | 7 (36.8) | 4 (26.7) | 3 (21.4) | 2 (40.0) | | 24 (28.9) | | | 24 (28.9) | 75.29 | 12.23 |
| 消化管出血 (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 悪性腫瘍 (%) | | | | | | | | | | | | | | 1 (8.3) | | 3 (15.8) | 2 (13.3) | 2 (14.3) | 1 (20.0) | | 9 (10.8) | | | 9 (10.8) | 81.78 | 7.28 |
| 悪液質/尿毒症 (%) | | | | | | | | | | | | | | | | 1 (5.3) | | 1 (7.1) | 1 (20.0) | | 3 (3.6) | | | 3 (3.6) | 84.67 | 7.57 |
| 心筋梗塞 (%) | | | | | | | | | | | | | | 1 (8.3) | | | | 1 (6.7) | | | 2 (2.4) | | | 2 (2.4) | 76.00 | 11.31 |
| カリウム中毒/頓死 (%) | | | | | | | | 1 (100.0) | | | | 1 (50.0) | | | 2 (16.7) | | | | 1 (7.1) | | 5 (6.0) | | | 5 (6.0) | 64.60 | 18.08 |
| 肝硬変症 (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 自殺/拒否 (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 腸閉塞 (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 肺血栓/肺塞栓 (%) | | | | | | | | | | | | | | 1 (8.3) | | | | | | | 1 (1.2) | | | 1 (1.2) | 69.00 | |
| 災害・事故死 (%) | | | | | | | | | | | | | | 1 (8.3) | | | | | | | 1 (1.2) | | | 1 (1.2) | 66.00 | |
| その他 (%) | | | | | | | | | | | | | | 1 (8.3) | 1 (20.0) | 3 (15.8) | 1 (6.7) | 2 (14.3) | | | 8 (9.6) | | | 8 (9.6) | 78.00 | 6.32 |
| 不明 (%) | | | | | | | | | | | | | | 4 (33.3) | | | | 3 (20.0) | 1 (7.1) | | 11 (13.3) | | | 11 (13.3) | 76.82 | 14.63 |
| 合計 (%) | | | | | | | | 1 (100.0) | 1 (100.0) | 2 (100.0) | 1 (100.0) | 2 (100.0) | 3 (100.0) | 12 (100.0) | 5 (100.0) | 19 (100.0) | 15 (100.0) | 14 (100.0) | 5 (100.0) | 3 (100.0) | 83 (100.0) | | | 83 (100.0) | 76.82 | 12.13 |
| 記載なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総計 | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 12 | 5 | 19 | 15 | 14 | 5 | 3 | 83 | | | 83 | 76.82 | 12.13 |

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。
 (C)Japanese Society for Dialysis Therapy
 2015年調査