

表 309 2015年死亡患者死亡原因分類(年齢別, 原疾患別)原疾患＝悪性高血圧

死因	5歳未満	5歳～	10歳～	15歳～	20歳～	25歳～	30歳～	35歳～	40歳～	45歳～	50歳～	55歳～	60歳～	65歳～	70歳～	75歳～	80歳～	85歳～	90歳～	95歳～	合計	不明	記載なし	総計	平均	標準偏差
心不全 (%)						1 (100.0)			1 (50.0)		2 (100.0)	1 (20.0)	4 (33.3)	10 (47.6)	5 (29.4)	6 (27.3)	10 (25.0)	9 (25.7)	6 (40.0)	1 (33.3)	56 (31.5)			56 (31.5)	75.59	13.51
脳血管障害 (%)													1 (8.3)	1 (4.8)	4 (23.5)	3 (13.6)	2 (5.0)	1 (2.9)	1 (6.7)		13 (7.3)			13 (7.3)	77.08	8.29
感染症 (%)												1 (20.0)	2 (16.7)	4 (19.0)	1 (5.9)	2 (9.1)	7 (17.5)	7 (20.0)	3 (20.0)		27 (15.2)			27 (15.2)	78.74	10.08
消化管出血 (%)										1 (50.0)							3 (7.5)		1 (6.7)		5 (2.8)			5 (2.8)	76.40	18.12
悪性腫瘍 (%)										1 (50.0)		1 (20.0)		2 (9.5)	2 (11.8)	4 (18.2)	6 (15.0)	2 (5.7)	1 (6.7)	1 (33.3)	20 (11.2)			20 (11.2)	77.60	11.43
悪液質/尿毒症 (%)																2 (9.1)	1 (2.5)	5 (14.3)		1 (33.3)	9 (5.1)			9 (5.1)	84.33	6.36
心筋梗塞 (%)												1 (20.0)	2 (16.7)		1 (5.9)	1 (4.5)	1 (2.5)	1 (2.9)			7 (3.9)			7 (3.9)	71.86	12.08
カリウム中毒/頓死 (%)							1 (100.0)						1 (8.3)			1 (4.5)					3 (1.7)			3 (1.7)	58.67	23.46
肝硬変症 (%)																	2 (5.0)				2 (1.1)			2 (1.1)	82.50	0.71
自殺/拒否 (%)													1 (8.3)	1 (4.8)							2 (1.1)			2 (1.1)	65.00	2.83
腸閉塞 (%)									1 (50.0)						1 (4.8)		1 (2.5)				3 (1.7)			3 (1.7)	65.00	19.31
肺血栓/肺塞栓 (%)																										
災害・事故死 (%)																										
その他 (%)													1 (8.3)	1 (4.8)	3 (17.6)	1 (4.5)	3 (7.5)	4 (11.4)	1 (6.7)		14 (7.9)			14 (7.9)	78.86	9.09
不明 (%)												1 (20.0)		1 (4.8)	1 (5.9)	2 (9.1)	4 (10.0)	6 (17.1)	2 (13.3)		17 (9.6)			17 (9.6)	81.41	9.29
合計 (%)						1 (100.0)	1 (100.0)		2 (100.0)	2 (100.0)	2 (100.0)	5 (100.0)	12 (100.0)	21 (100.0)	17 (100.0)	22 (100.0)	40 (100.0)	35 (100.0)	15 (100.0)	3 (100.0)	178 (100.0)			178 (100.0)	77.03	12.08
記載なし																										
総計						1	1		2	2	2	5	12	21	17	22	40	35	15	3	178			178	77.03	12.08

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する％です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査