

表 311 2015年死亡患者死亡原因分類(年齢別, 原疾患別)原疾患=SLE腎炎

死因	5歳未満	5歳～	10歳～	15歳～	20歳～	25歳～	30歳～	35歳～	40歳～	45歳～	50歳～	55歳～	60歳～	65歳～	70歳～	75歳～	80歳～	85歳～	90歳～	95歳～	合計	不明	記載なし	総計	平均	標準偏差
心不全 (%)									2 (100.0)	2 (25.0)	1 (14.3)	3 (15.8)	5 (25.0)	8 (24.2)	10 (32.3)	7 (23.3)	10 (35.7)	6 (35.3)	2 (33.3)		56 (26.9)			56 (26.9)	71.75	12.05
脳血管障害 (%)								1 (20.0)		1 (12.5)		3 (15.8)	1 (5.0)	4 (12.1)	3 (9.7)	2 (6.7)	1 (3.6)				16 (7.7)			16 (7.7)	65.06	11.07
感染症 (%)								2 (40.0)		1 (12.5)	2 (28.6)	8 (42.1)	6 (30.0)	4 (12.1)	5 (16.1)	7 (23.3)	7 (25.0)	6 (35.3)	1 (16.7)		49 (23.6)			49 (23.6)	69.82	13.43
消化管出血 (%)								1 (50.0)						1 (3.0)		1 (3.3)					3 (1.4)			3 (1.4)	58.33	24.95
悪性腫瘍 (%)										1 (12.5)	2 (28.6)	2 (10.5)	4 (20.0)	3 (9.1)		1 (3.3)	1 (3.6)	2 (11.8)	2 (33.3)		18 (8.7)			18 (8.7)	68.11	14.34
悪液質/尿毒症 (%)														2 (6.1)		2 (6.7)	1 (3.6)	1 (5.9)			6 (2.9)			6 (2.9)	75.17	7.81
心筋梗塞 (%)										1 (12.5)				2 (6.1)		1 (3.3)	2 (7.1)				6 (2.9)			6 (2.9)	70.50	12.91
カリウム中毒/頓死 (%)								1 (20.0)		1 (12.5)					1 (3.2)	1 (3.3)					4 (1.9)			4 (1.9)	58.75	18.15
肝硬変症 (%)													1 (5.0)		1 (3.2)	1 (3.3)					3 (1.4)			3 (1.4)	70.33	7.64
自殺/拒否 (%)																										
腸閉塞 (%)														2 (6.1)							2 (1.0)			2 (1.0)	67.00	2.83
肺血栓/肺塞栓 (%)																1 (3.2)					1 (0.5)			1 (0.5)	72.00	
災害・事故死 (%)																										
その他 (%)								1 (50.0)		1 (12.5)		1 (5.3)	2 (10.0)	3 (9.1)	7 (22.6)	3 (10.0)	6 (21.4)	1 (5.9)	1 (16.7)		26 (12.5)			26 (12.5)	71.69	12.69
不明 (%)								1 (20.0)			2 (28.6)	2 (10.5)	1 (5.0)	4 (12.1)	3 (9.7)	4 (13.3)		1 (5.9)			18 (8.7)			18 (8.7)	66.72	12.44
合計 (%)								2 (100.0)	5 (100.0)	2 (100.0)	8 (100.0)	7 (100.0)	19 (100.0)	20 (100.0)	33 (100.0)	31 (100.0)	30 (100.0)	28 (100.0)	17 (100.0)	6 (100.0)	208 (100.0)			208 (100.0)	69.58	12.83
記載なし																										
総計								2	5	2	8	7	19	20	33	31	30	28	17	6	208			208	69.58	12.83

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。
 (C)Japanese Society for Dialysis Therapy
 2015年調査