

表 312 2015年死亡患者死亡原因分類(年齢別、原疾患別)原疾患=アミロイド腎

死因	5歳未満	5歳～	10歳～	15歳～	20歳～	25歳～	30歳～	35歳～	40歳～	45歳～	50歳～	55歳～	60歳～	65歳～	70歳～	75歳～	80歳～	85歳～	90歳～	95歳～	合計	不明	記載なし	総計	平均	標準偏差	
心不全 (%)										1 (33.3)	1 (10.0)	1 (10.0)	8 (50.0)	5 (20.0)	7 (53.8)						23			23	74.78	7.41	
脳血管障害 (%)										1 (25.0)				2 (8.0)							(25.6)			(25.6)			
感染症 (%)										4 (40.0)	4 (40.0)	5 (31.3)	6 (24.0)	1 (7.7)	1 (14.3)	1 (50.0)					3 (3.3)			3 (3.3)		10.58	
消化管出血 (%)										1 (33.3)	1 (25.0)	2 (20.0)	2 (10.0)	2 (12.5)	2 (8.0)	2 (15.4)	1 (14.3)	1 (50.0)			22 (24.4)			22 (24.4)		7.89	
悪性腫瘍 (%)										1 (33.3)	1 (25.0)	2 (20.0)	1 (10.0)	2 (12.5)	2 (8.0)	2 (15.4)	1 (14.3)	1 (50.0)			13 (14.4)			13 (14.4)		12.23	
悪液質/尿毒症 (%)										1 (33.3)	1 (25.0)	2 (20.0)	1 (10.0)	1 (6.3)	4 (16.0)	1 (14.3)	1 (50.0)			5 (5.6)			5 (5.6)		2.61		
心筋梗塞 (%)										1 (33.3)	1 (25.0)	2 (20.0)	1 (10.0)	2 (12.5)	2 (8.0)	2 (15.4)	1 (14.3)	1 (50.0)			2 (2.2)			2 (2.2)		2.12	
カリウム中毒/頓死 (%)										1 (33.3)	1 (25.0)	2 (20.0)	1 (10.0)	2 (12.5)	2 (8.0)	2 (15.4)	1 (14.3)	1 (50.0)			13 (14.4)			13 (14.4)		13 (14.4)	
肝硬変症 (%)										1 (33.3)	1 (25.0)	2 (20.0)	1 (10.0)	2 (12.5)	2 (8.0)	2 (15.4)	1 (14.3)	1 (50.0)			2 (2.2)			2 (2.2)		2.12	
自殺/拒否 (%)										1 (33.3)	1 (25.0)	2 (20.0)	1 (10.0)	2 (12.5)	2 (8.0)	2 (15.4)	1 (14.3)	1 (50.0)			2 (2.2)			2 (2.2)		2.12	
腸閉塞 (%)										1 (33.3)	1 (25.0)	2 (20.0)	1 (10.0)	2 (12.5)	2 (8.0)	2 (15.4)	1 (14.3)	1 (50.0)			2 (2.2)			2 (2.2)		2.12	
肺血栓/肺塞栓 (%)										1 (33.3)	1 (25.0)	2 (20.0)	1 (10.0)	2 (12.5)	2 (8.0)	2 (15.4)	1 (14.3)	1 (50.0)			2 (2.2)			2 (2.2)		2.12	
災害・事故死 (%)										1 (33.3)	1 (25.0)	2 (20.0)	1 (10.0)	2 (12.5)	2 (8.0)	2 (15.4)	1 (14.3)	1 (50.0)			2 (2.2)			2 (2.2)		2.12	
その他 (%)										1 (33.3)	1 (25.0)	2 (20.0)	1 (10.0)	2 (12.5)	2 (8.0)	2 (15.4)	1 (14.3)	1 (50.0)			2 (2.2)			2 (2.2)		2.12	
不明 (%)										1 (33.3)	1 (25.0)	2 (20.0)	1 (10.0)	2 (12.5)	2 (8.0)	2 (15.4)	1 (14.3)	1 (50.0)			2 (2.2)			2 (2.2)		2.12	
合計 (%)										3 (100.0)	4 (100.0)	10 (100.0)	10 (100.0)	16 (100.0)	25 (100.0)	13 (100.0)	7 (100.0)	2 (100.0)	90 (100.0)		90 (100.0)			90 (100.0)		9.09	
記載なし																											
総計										3	4	10	10	16	25	13	7	2			90			90	73.52	9.09	

数値下のカッコ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査