

表 313 2015年死亡患者死亡原因分類(年齢別、原疾患別)原疾患=痛風腎

死因	5歳未満	5歳～	10歳～	15歳～	20歳～	25歳～	30歳～	35歳～	40歳～	45歳～	50歳～	55歳～	60歳～	65歳～	70歳～	75歳～	80歳～	85歳～	90歳～	95歳～	合計	不明	記載なし	総計	平均	標準偏差					
心不全 (%)														1 (50.0)	3 (75.0)	1 (11.1)	2 (13.3)	9 (50.0)	3 (21.4)	2 (15.4)	1 (100.0)	1 (100.0)	1 (29.9)	23	23	76.57	9.86				
脳血管障害 (%)															1 (6.7)	2 (11.1)					3 (3.9)	3 (3.9)	3 (3.9)	3 (3.9)	3 (3.9)	76.33	4.62				
感染症 (%)															1 (25.0)	3 (33.3)	3 (20.0)	2 (11.1)	4 (28.6)	5 (38.5)					18 (23.4)	18 (23.4)	78.00	8.47			
消化管出血 (%)															2 (22.2)						2 (2.6)	2 (2.6)	2 (2.6)	2 (2.6)	2 (2.6)	65.50	0.71				
悪性腫瘍 (%)															1 (11.1)	4 (26.7)	2 (11.1)	1 (7.1)			8 (10.4)	8 (10.4)	8 (10.4)	8 (10.4)	8 (10.4)	74.38	3.85				
悪液質/尿毒症 (%)																1 (6.7)	1 (6.7)		1 (7.7)		2 (2.6)	2 (2.6)	2 (2.6)	2 (2.6)	2 (2.6)	80.00	11.31				
心筋梗塞 (%)																	2 (14.3)	1 (7.7)	2 (7.7)	1 (7.7)	3 (3.9)	3 (3.9)	3 (3.9)	3 (3.9)	3 (3.9)	82.67	2.08				
カリウム中毒/頓死 (%)															1 (50.0)					1 (1.3)	1 (1.3)	1 (1.3)	1 (1.3)	1 (1.3)	58.00						
肝硬変症 (%)																1 (6.7)	1 (6.7)				1 (1.3)	1 (1.3)	1 (1.3)	1 (1.3)	1 (1.3)	70.00					
自殺/拒否 (%)																1 (6.7)				1 (1.3)	1 (1.3)	1 (1.3)	1 (1.3)	1 (1.3)	70.00						
腸閉塞 (%)																															
肺血栓/肺塞栓 (%)																															
災害・事故死 (%)																															
その他 (%)																															
不明 (%)																															
合計 (%)															2 (100.0)	4 (100.0)	9 (100.0)	15 (100.0)	18 (100.0)	14 (100.0)	13 (100.0)	1 (100.0)	1 (100.0)	1 (100.0)	77 (100.0)	77 (100.0)	77 (100.0)	77 (100.0)	77 (100.0)	76.75	8.30
記載なし																															
総計															2 (22.2)	4 (13.3)	9 (5.6)	15 (21.4)	18 (30.8)	14 (30.8)	13 (30.8)	1 (30.8)	1 (30.8)	1 (30.8)	8 (10.4)	8 (10.4)	8 (10.4)	8 (10.4)	8 (10.4)	75.75	6.80

数値下のカッコ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査