

表 319 2015年死亡患者死亡原因分類(年齢別, 原疾患別)原疾患＝骨髄腫

死因	5歳未満	5歳～	10歳～	15歳～	20歳～	25歳～	30歳～	35歳～	40歳～	45歳～	50歳～	55歳～	60歳～	65歳～	70歳～	75歳～	80歳～	85歳～	90歳～	95歳～	合計	不明	記載なし	総計	平均	標準偏差
心不全 (%)									1 (100.0)					2 (15.4)	1 (5.6)	4 (17.4)	2 (11.1)	4 (26.7)			14 (13.2)			14 (13.2)	76.21	11.36
脳血管障害 (%)																										
感染症 (%)										1 (100.0)			1 (14.3)	2 (15.4)	5 (27.8)	2 (8.7)	2 (11.1)	1 (6.7)		1 (100.0)	15 (14.2)			15 (14.2)	73.47	11.44
消化管出血 (%)																	1 (5.6)				1 (0.9)			1 (0.9)	82.00	
悪性腫瘍 (%)				1 (100.0)							4 (100.0)	2 (66.7)	5 (71.4)	8 (61.5)	9 (50.0)	13 (56.5)	13 (72.2)	7 (46.7)		1 (100.0)	63 (59.4)			63 (59.4)	73.14	12.12
悪液質/尿毒症 (%)																		1 (6.7)			1 (0.9)			1 (0.9)	87.00	
心筋梗塞 (%)																1 (4.3)					1 (0.9)			1 (0.9)	77.00	
カリウム中毒/頓死 (%)																										
肝硬変症 (%)																										
自殺/拒否 (%)																										
腸閉塞 (%)																										
肺血栓/肺塞栓 (%)																										
災害・事故死 (%)																										
その他 (%)												1 (33.3)			2 (11.1)	1 (4.3)		2 (13.3)			6 (5.7)			6 (5.7)	75.17	10.76
不明 (%)													1 (14.3)	1 (7.7)	1 (5.6)	2 (8.7)				5 (4.7)			5 (4.7)	71.20	6.22	
合計 (%)				1 (100.0)					1 (100.0)	1 (100.0)	4 (100.0)	3 (100.0)	7 (100.0)	13 (100.0)	18 (100.0)	23 (100.0)	18 (100.0)	15 (100.0)	1 (100.0)	1 (100.0)	106 (100.0)			106 (100.0)	73.87	11.44
記載なし																										
総計				1					1	1	4	3	7	13	18	23	18	15	1	1	106			106	73.87	11.44

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する％です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査