

表 320 2015年死亡患者死亡原因分類(年齢別、原疾患別)原疾患=腎形成不全

死因	5歳未満	5歳～	10歳～	15歳～	20歳～	25歳～	30歳～	35歳～	40歳～	45歳～	50歳～	55歳～	60歳～	65歳～	70歳～	75歳～	80歳～	85歳～	90歳～	95歳～	合計	不明	記載なし	総計	平均	標準偏差	
心不全 (%)														1 (33.3)	1 (100.0)						2 (12.5)			2 (12.5)	78.50	7.78	
脳血管障害 (%)														1 (33.3)							1 (6.3)			1 (6.3)	74.00		
感染症 (%)																1 (50.0)	2 (50.0)				4 (25.0)			4 (25.0)	66.50	33.12	
消化管出血 (%)																											
悪性腫瘍 (%)														1 (33.3)	1 (50.0)	1 (25.0)						4 (25.0)			4 (25.0)	69.75	17.88
悪液質/尿毒症 (%)																											
心筋梗塞 (%)																											
カリウム中毒/頓死 (%)																											
肝硬変症 (%)																											
自殺/拒否 (%)																											
腸閉塞 (%)			1 (100.0)		1 (100.0)															2 (12.5)			2 (12.5)	16.00	5.66		
肺血栓/肺塞栓 (%)																											
災害・事故死 (%)																											
その他 (%)								1 (100.0)													2 (12.5)			2 (12.5)	61.50	44.55	
不明 (%)																					1 (6.3)			1 (6.3)	89.00		
合計 (%)		1 (100.0)	1 (100.0)	1 (100.0)	1 (100.0)	1 (100.0)	1 (100.0)							3 (100.0)	2 (100.0)	1 (100.0)	4 (100.0)	1 (100.0)	1 (100.0)	1 (100.0)	16 (100.0)			16 (100.0)	63.75	28.58	
記載なし																											
総計		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	2	1	4	1	16				16	63.75	28.58		

数値下の括弧内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査