

表 325 2015年死亡患者死亡原因の詳細(性別との関係)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全	3,841	2,347	6,188		6,188
(%)	(22.6)	(25.8)	(23.7)		(23.7)
肺水腫(溢水)	203	106	309		309
(%)	(1.2)	(1.2)	(1.2)		(1.2)
急性心筋梗塞(発症30日以内死亡)	669	289	958		958
(%)	(3.9)	(3.2)	(3.7)		(3.7)
虚血性心疾患(急性心筋梗塞以外)	198	89	287		287
(%)	(1.2)	(1.0)	(1.1)		(1.1)
不整脈、伝導障害	272	131	403		403
(%)	(1.6)	(1.4)	(1.5)		(1.5)
心内膜炎および弁膜症	118	73	191		191
(%)	(0.7)	(0.8)	(0.7)		(0.7)
その他の心疾患	286	167	453		453
(%)	(1.7)	(1.8)	(1.7)		(1.7)
くも膜下出血	95	44	139		139
(%)	(0.6)	(0.5)	(0.5)		(0.5)
脳内出血	575	285	860		860
(%)	(3.4)	(3.1)	(3.3)		(3.3)
脳梗塞	401	327	728		728
(%)	(2.4)	(3.6)	(2.8)		(2.8)
その他の脳血管疾患	117	72	189		189
(%)	(0.7)	(0.8)	(0.7)		(0.7)
敗血症	1,432	944	2,376		2,376
(%)	(8.4)	(10.4)	(9.1)		(9.1)
中枢神経系感染症	24	13	37		37
(%)	(0.1)	(0.1)	(0.1)		(0.1)
肺炎	2,411	902	3,313		3,313
(%)	(14.2)	(9.9)	(12.7)		(12.7)
インフルエンザ	20	22	42		42
(%)	(0.1)	(0.2)	(0.2)		(0.2)
尿路感染症	16	13	29		29
(%)	(0.1)	(0.1)	(0.1)		(0.1)
消化管・胆道系感染症・腹膜炎	147	98	245		245
(%)	(0.9)	(1.1)	(0.9)		(0.9)
劇症(急性)ウイルス肝炎	4	2	6		6
(%)	(0.0)	(0.0)	(0.0)		(0.0)
結核	41	13	54		54
(%)	(0.2)	(0.1)	(0.2)		(0.2)
ヒト免疫不全ウイルス[HIV]感染症	1		1		1
(%)	(0.0)		(0.0)		(0.0)
その他の感染症	190	100	290		290
(%)	(1.1)	(1.1)	(1.1)		(1.1)
中枢神経系の悪性新生物	19	5	24		24
(%)	(0.1)	(0.1)	(0.1)		(0.1)
呼吸器系の悪性新生物	420	95	515		515
(%)	(2.5)	(1.0)	(2.0)		(2.0)
肝癌	349	77	426		426
(%)	(2.1)	(0.8)	(1.6)		(1.6)
肝癌以外の消化器系の悪性新生物	469	194	663		663
(%)	(2.8)	(2.1)	(2.5)		(2.5)
乳房の悪性新生物	1	41	42		42
(%)	(0.0)	(0.5)	(0.2)		(0.2)
性器の悪性新生物	52	50	102		102
(%)	(0.3)	(0.5)	(0.4)		(0.4)
腎の悪性新生物	177	41	218		218
(%)	(1.0)	(0.5)	(0.8)		(0.8)

表 325 2015年死亡患者死亡原因の詳細(性別との関係)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
内分泌腺の悪性新生物	31	18	49		49
(%)	(0.2)	(0.2)	(0.2)		(0.2)
造血・リンパ組織の悪性新生物	181	68	249		249
(%)	(1.1)	(0.7)	(1.0)		(1.0)
その他の悪性新生物	314	115	429		429
(%)	(1.8)	(1.3)	(1.6)		(1.6)
ウイルス性肝硬変	71	29	100		100
(%)	(0.4)	(0.3)	(0.4)		(0.4)
ウイルス性以外の肝硬変	135	45	180		180
(%)	(0.8)	(0.5)	(0.7)		(0.7)
腸の血行障害	118	67	185		185
(%)	(0.7)	(0.7)	(0.7)		(0.7)
イレウス	68	43	111		111
(%)	(0.4)	(0.5)	(0.4)		(0.4)
消化管出血	279	142	421		421
(%)	(1.6)	(1.6)	(1.6)		(1.6)
被嚢性腹膜硬化症	8	3	11		11
(%)	(0.0)	(0.0)	(0.0)		(0.0)
その他の消化器疾患	112	66	178		178
(%)	(0.7)	(0.7)	(0.7)		(0.7)
肺梗塞、肺塞栓症	42	30	72		72
(%)	(0.2)	(0.3)	(0.3)		(0.3)
悪液質	384	316	700		700
(%)	(2.3)	(3.5)	(2.7)		(2.7)
尿毒症	226	166	392		392
(%)	(1.3)	(1.8)	(1.5)		(1.5)
認知症	36	30	66		66
(%)	(0.2)	(0.3)	(0.3)		(0.3)
その他の悪液質/尿毒症	94	87	181		181
(%)	(0.6)	(1.0)	(0.7)		(0.7)
高カリウム血症	77	34	111		111
(%)	(0.5)	(0.4)	(0.4)		(0.4)
原因不明の突然死	461	176	637		637
(%)	(2.7)	(1.9)	(2.4)		(2.4)
自殺	76	12	88		88
(%)	(0.4)	(0.1)	(0.3)		(0.3)
治療拒否(透析拒否)	79	45	124		124
(%)	(0.5)	(0.5)	(0.5)		(0.5)
災害・事故死	94	34	128		128
(%)	(0.6)	(0.4)	(0.5)		(0.5)
その他	1,551	1,045	2,596		2,596
(%)	(9.1)	(11.5)	(9.9)		(9.9)
合計	16,985	9,111	26,096		26,096
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		(100.0)
記載なし	2,023	970	2,993		2,993
総計	19,008	10,081	29,089		29,089

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査