

表 327 2015年死亡患者死亡原因の詳細(透析期間との関係)

原因	3ヶ月未満	3ヶ月～	6ヶ月～	1年～	2年～	5年～	10年～	15年～	20年～	25年～	合計	不明	記載なし	総計
心不全 (%)	281 (4.3)	242 (4.0)	290 (4.7)	492 (8.0)	1,490 (24.4)	1,740 (28.4)	813 (13.3)		562 (9.2)	226 (3.7)	6,116 (100.0)		29	6,188
肺水腫(溢水) (%)	17 (0.5)	20 (0.5)	15 (0.4)	34 (1.1)	65 (21.2)	95 (30.9)	30 (9.8)		24 (7.8)	7 (2.3)	307 (100.0)		2	309
急性心筋梗塞(発症30日以 内死亡) (%)	30 (3.2)	16 (1.7)	46 (4.8)	84 (8.8)	214 (22.5)	306 (32.2)	144 (15.1)		76 (8.0)	35 (3.7)	951 (100.0)	1	6	958
虚血性心疾患(急性心筋梗 塞以外) (%)	12 (4.2)	4 (1.4)	17 (5.9)	17 (5.9)	75 (26.2)	78 (27.3)	33 (11.5)		40 (14.0)	10 (3.5)	286 (100.0)	1		287
不整脈、伝導障害 (%)	31 (7.8)	10 (2.5)	16 (4.0)	21 (5.3)	83 (20.8)	117 (29.3)	59 (14.8)		47 (11.8)	15 (3.8)	399 (100.0)	3	1	403
心内膜炎および弁膜症 (%)	6 (3.2)	8 (4.2)	9 (4.8)	8 (4.2)	32 (16.9)	52 (27.5)	31 (16.4)		34 (18.0)	9 (4.8)	189 (100.0)	2		191
その他の心疾患 (%)	31 (6.9)	22 (4.9)	17 (3.8)	30 (6.7)	98 (21.8)	126 (28.1)	57 (12.7)		48 (10.7)	20 (4.5)	449 (100.0)		4	453
くも膜下出血 (%)	6 (4.4)	6 (4.4)	12 (8.8)	6 (4.4)	37 (27.2)	32 (23.5)	17 (12.5)		15 (11.0)	5 (3.7)	136 (100.0)	2	1	139
脳内出血 (%)	19 (2.2)	35 (4.1)	35 (4.1)	81 (9.5)	188 (22.0)	222 (25.9)	153 (17.9)		100 (11.7)	23 (2.7)	856 (100.0)	3	1	860
脳梗塞 (%)	32 (4.4)	27 (3.7)	33 (4.6)	62 (8.6)	172 (23.9)	202 (28.0)	94 (13.0)		74 (10.3)	25 (3.5)	721 (100.0)	3	4	728
その他の脳血管疾患 (%)	4 (2.1)	9 (4.8)	10 (5.3)	15 (7.9)	49 (25.9)	46 (24.3)	23 (12.2)		25 (13.2)	8 (4.2)	189 (100.0)			189
敗血症 (%)	160 (6.8)	101 (4.3)	117 (5.0)	175 (7.5)	455 (19.4)	627 (26.7)	349 (14.9)		248 (10.6)	114 (4.9)	2,346 (100.0)	21	9	2,376
中枢神経系感染症 (%)	1 (2.9)	1 (2.9)	3 (8.6)	5 (14.3)	10 (28.6)	4 (11.4)	4 (11.4)		6 (17.1)	1 (2.9)	35 (100.0)	1	1	37
肺炎 (%)	190 (5.8)	144 (4.4)	166 (5.0)	274 (8.3)	850 (25.8)	899 (27.3)	434 (13.2)		247 (7.5)	86 (2.6)	3,290 (100.0)	8	15	3,313
インフルエンザ (%)	1 (2.4)		4 (9.5)	3 (7.1)	9 (21.4)	10 (23.8)	7 (16.7)		5 (11.9)	3 (7.1)	42 (100.0)			42
尿路感染症 (%)			3 (10.3)	2 (6.9)	7 (24.1)	6 (20.7)	7 (24.1)		4 (13.8)		29 (100.0)			29
消化管・胆道系感染症・腹 膜炎 (%)	14 (5.7)	10 (4.1)	8 (3.3)	24 (9.8)	61 (24.9)	51 (20.8)	35 (14.3)		31 (12.7)	11 (4.5)	245 (100.0)			245
劇症(急性)ウイルス肝炎 (%)					3 (50.0)	2 (33.3)	1 (16.7)				6 (100.0)			6
結核 (%)	9 (16.7)	4 (7.4)	6 (11.1)	6 (11.1)	14 (25.9)	3 (5.6)	9 (16.7)		3 (5.6)		54 (100.0)			54
ヒト免疫不全ウイルス(HIV) 感染症 (%)						1 (100.0)					1 (100.0)			1
その他の感染症 (%)	21 (7.4)	16 (5.6)	19 (6.7)	18 (6.3)	57 (20.0)	70 (24.6)	36 (12.6)		34 (11.9)	14 (4.9)	285 (100.0)	1	4	290
中枢神経系の悪性新生物 (%)		1 (4.2)	1 (4.2)	2 (8.3)	7 (29.2)	7 (29.2)	1 (4.2)		3 (12.5)	2 (8.3)	24 (100.0)			24
呼吸器系の悪性新生物 (%)	13 (2.5)	16 (3.1)	35 (6.8)	73 (14.2)	148 (28.8)	128 (25.0)	50 (9.7)		34 (6.6)	16 (3.1)	513 (100.0)	1	1	515
肝癌 (%)	21 (4.9)	19 (4.5)	26 (6.1)	57 (13.4)	124 (29.1)	105 (24.6)	46 (10.8)		17 (4.0)	11 (2.6)	426 (100.0)			426
肝癌以外の消化器系の悪 性新生物 (%)	29 (4.4)	35 (5.3)	44 (6.7)	71 (10.8)	165 (25.2)	178 (27.1)	88 (10.4)		51 (7.8)	15 (2.3)	656 (100.0)	4	3	663
乳房の悪性新生物 (%)			2 (4.8)	6 (14.3)	12 (28.6)	5 (11.9)	4 (9.5)		7 (16.7)	6 (14.3)	42 (100.0)			42
性器の悪性新生物 (%)	4 (4.0)	9 (8.9)	10 (9.9)	9 (8.9)	31 (30.7)	20 (19.8)	11 (10.9)		4 (4.0)	3 (3.0)	101 (100.0)	1		102
胃の悪性新生物 (%)	9 (4.2)	12 (5.6)	9 (4.2)	21 (9.8)	26 (12.1)	30 (14.0)	28 (13.1)		40 (18.7)	39 (18.2)	214 (100.0)		4	218
内分泌腺の悪性新生物 (%)	1 (2.0)	1 (2.0)	2 (4.1)	3 (6.1)	22 (44.9)	8 (16.3)	3 (6.1)		4 (8.2)	5 (10.2)	49 (100.0)			49
造血・リンパ組織の悪性新 生物 (%)	35 (14.4)	28 (11.5)	31 (12.8)	40 (16.5)	44 (18.1)	34 (14.0)	23 (9.5)		6 (2.5)	2 (0.8)	243 (100.0)	4	2	249
その他の悪性新生物 (%)	21 (4.9)	22 (5.2)	26 (6.1)	61 (14.3)	110 (25.8)	87 (20.4)	50 (11.7)		35 (8.2)	15 (3.5)	427 (100.0)	1	1	429
ウイルス性肝硬変 (%)	6 (6.1)	2 (2.0)	8 (8.1)	10 (10.1)	21 (21.2)	22 (22.2)	15 (15.2)		11 (11.1)	4 (4.0)	99 (100.0)	1		100
ウイルス性以外の肝硬変 (%)	15 (8.4)	11 (6.1)	19 (10.6)	23 (12.8)	25 (25.1)	45 (25.1)	21 (11.7)		14 (7.8)	6 (3.4)	179 (100.0)	1		180
腸の血行障害 (%)	11 (6.0)	9 (4.9)	10 (5.5)	8 (4.4)	38 (20.9)	40 (22.0)	35 (19.2)		18 (9.9)	13 (7.1)	182 (100.0)	2	1	185
イレウス (%)	4 (3.6)	2 (1.8)	5 (4.5)	5 (4.5)	22 (19.8)	28 (25.2)	18 (16.2)		16 (14.4)	11 (9.9)	111 (100.0)			111
消化管出血 (%)	28 (6.7)	11 (2.6)	28 (6.7)	30 (7.2)	100 (24.0)	92 (22.1)	64 (15.4)		42 (10.1)	21 (5.0)	416 (100.0)	1	4	421
被覆性腹膜硬化症 (%)		1 (9.1)		1 (9.1)	1 (9.1)	3 (27.3)	1 (9.1)		2 (18.2)	2 (18.2)	11 (100.0)			11
その他の消化器疾患 (%)	12 (6.8)	16 (9.0)	9 (5.1)	12 (6.8)	36 (20.3)	36 (20.3)	27 (15.3)		18 (10.2)	11 (6.2)	177 (100.0)		1	178
肺梗塞、肺塞栓症 (%)	1 (1.4)	3 (4.2)	3 (4.2)	6 (8.3)	20 (27.8)	24 (33.3)	8 (11.1)		7 (9.7)		72 (100.0)			72
悪液質 (%)	22 (3.2)	22 (3.2)	48 (6.9)	51 (7.3)	169 (24.2)	198 (28.4)	96 (13.8)		57 (8.2)	34 (4.9)	697 (100.0)	2	1	700
尿毒症 (%)	35 (9.1)	13 (3.4)	20 (5.2)	35 (9.1)	92 (23.9)	107 (27.8)	43 (11.2)		29 (7.5)	11 (2.9)	385 (100.0)	2	5	392
認知症 (%)	2 (3.0)	4 (6.1)	2 (3.0)	4 (6.1)	22 (33.3)	12 (18.2)	12 (18.2)		8 (12.1)		66 (100.0)			66
その他の悪液質/尿毒症 (%)	10 (5.7)	7 (4.0)	5 (2.9)	19 (10.9)	40 (28.0)	45 (25.7)	17 (9.7)		12 (6.9)	11 (6.3)	175 (100.0)	1	5	181
高カリウム血症 (%)	4 (3.6)	5 (4.5)		6 (5.5)	30 (27.3)	32 (29.1)	15 (13.6)		12 (10.9)	6 (5.5)	110 (100.0)		1	111
原因不明の突然死 (%)	16 (2.5)	17 (2.7)	18 (2.8)	52 (8.2)	176 (27.7)	182 (28.7)	107 (16.9)		40 (6.3)	27 (4.3)	635 (100.0)	2		637
自殺 (%)		2 (2.3)	5 (5.7)	3 (3.4)	27 (30.7)	29 (33.0)	10 (11.4)		7 (8.0)	5 (5.7)	88 (100.0)			88
治療拒否(透析拒否) (%)	9 (7.3)	5 (4.1)	6 (4.9)	17 (13.8)	26 (21.1)	32 (26.0)	17 (13.8)		4 (3.3)	7 (5.7)	123 (100.0)		1	124
災害・事故死 (%)	5 (3.9)	1 (0.8)	10 (7.8)	10 (7.8)	31 (24.2)	35 (27.3)	14 (10.9)		13 (10.2)	9 (7.0)	128 (100.0)			128
その他 (%)	159 (6.2)	109 (4.2)	125 (4.9)	214 (8.3)	586 (22.8)	697 (27.1)	358 (13.9)		241 (9.4)	79 (3.1)	2,568 (100.0)	13	15	2,596
合計 (%)	1,317 (5.1)	1,058 (4.1)	1,333 (5.2)	2,206 (8.5)	6,129 (23.7)	6,950 (26.9)	3,498 (13.5)		2,375 (9.2)	983 (3.8)	25,849 (100.0)	111	136	26,096
記載なし (%)	98 (3.3)	105 (3.6)	129 (4.4)	264 (8.9)	745 (25.2)	836 (28.3)	416 (14.1)		264 (8.9)	96 (3.3)	2,953 (100.0)	16	24	2,993
総計 (%)	1,415 (4.9)	1,163 (4.0)	1,462 (5.1)	2,470 (8.6)	6,874 (23.9)	7,786 (27.0)	3,914 (13.9)		2,639 (9.2)	1,079 (3.7)	28,802 (100.0)	127	160	29,089

数値下のかつこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査