

表 334 1983年以降導入2015年末患者治療方法, 透析歴別

治療方法	2年未満	2年～	5年～	10年～	15年～	20年～	25年～	30年～	35年～	40年～	合計	不明	記載なし	総計	平均	標準偏差
施設血液透析	58,509	63,383	62,337	31,462	16,192	8,464	4,288	1,563			246,198	300		246,498	6.58	6.52
(%)	(84.3)	(80.6)	(80.1)	(78.5)	(75.1)	(70.4)	(63.7)	(59.8)			(79.7)	(76.5)		(79.7)		
血液透析濾過	7,153	12,035	13,771	8,127	5,063	3,274	2,103	839			52,365	63		52,428	8.94	7.66
(%)	(10.3)	(15.3)	(17.7)	(20.3)	(23.5)	(27.2)	(31.2)	(32.1)			(17.0)	(16.1)		(17.0)		
血液濾過	5	5	3	1	1		1				16			16	6.06	8.05
(%)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)		(0.0)				(0.0)			(0.0)		
血液吸着透析	1	7	10	60	142	229	302	201			952			952	23.93	6.16
(%)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.1)	(0.7)	(1.9)	(4.5)	(7.7)			(0.3)			(0.3)		
在宅血液透析	31	106	160	96	70	38	24	6			531	11		542	10.16	7.31
(%)	(0.0)	(0.1)	(0.2)	(0.2)	(0.3)	(0.3)	(0.4)	(0.2)			(0.2)	(2.8)		(0.2)		
腹膜透析	3,680	3,102	1,520	314	87	26	12	5			8,746	18		8,764	2.97	3.46
(%)	(5.3)	(3.9)	(2.0)	(0.8)	(0.4)	(0.2)	(0.2)	(0.2)			(2.8)	(4.6)		(2.8)		
合計	69,379	78,638	77,801	40,060	21,555	12,031	6,730	2,614			308,808	392		309,200	6.93	6.82
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)			(100.0)	(100.0)		(100.0)		
記載なし																
総計	69,379	78,638	77,801	40,060	21,555	12,031	6,730	2,614			308,808	392		309,200	6.93	6.82

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査