

表 489 HDF希釈方法 nPCR(g/kg/day)別 (オフラインHDF 男性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上)

nPCR	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
0.4未満 (%)		4 (100.0)			4 (100.0)			4
0.4～ (%)	12 (12.6)	83 (87.4)			95 (100.0)		10	105
0.6～ (%)	85 (13.1)	563 (86.6)		2 (0.3)	650 (100.0)		83	733
0.8～ (%)	114 (11.6)	866 (88.3)		1 (0.1)	981 (100.0)		131	1,112
1.0～ (%)	28 (7.8)	333 (92.2)			361 (100.0)		44	405
1.2～ (%)	7 (11.1)	56 (88.9)			63 (100.0)		8	71
1.4～ (%)	1 (12.5)	7 (87.5)			8 (100.0)		2	10
1.6～ (%)		1 (100.0)			1 (100.0)			1
1.8～ (%)								
2.0～ (%)							1	1
合計 (%)	247 (11.4)	1,913 (88.4)		3 (0.1)	2,163 (100.0)		279	2,442
記載なし (%)	20 (14.5)	118 (85.5)			138 (100.0)		32	170
総計 (%)	267 (11.6)	2,031 (88.3)		3 (0.1)	2,301 (100.0)		311	2,612
平均	0.84	0.87		0.72	0.86		0.87	0.87
標準偏差	0.17	0.17		0.10	0.17		0.19	0.17

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査