

表 490 HDF希釈方法 nPCR(g/kg/day)別 (オフラインHDF 女性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上)

nPCR	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
0.4未満 (%)	1 (33.3)	2 (66.7)			3 (100.0)		1	4
0.4～ (%)	5 (11.9)	37 (88.1)			42 (100.0)		4	46
0.6～ (%)	40 (11.0)	324 (88.8)		1 (0.3)	365 (100.0)		58	423
0.8～ (%)	81 (12.5)	564 (87.3)		1 (0.2)	646 (100.0)		97	743
1.0～ (%)	31 (9.3)	302 (90.7)			333 (100.0)		54	387
1.2～ (%)	4 (5.2)	73 (94.8)			77 (100.0)		12	89
1.4～ (%)		7 (100.0)			7 (100.0)		2	9
1.6～ (%)								
1.8～ (%)								
2.0～ (%)								
合計 (%)	162 (11.0)	1,309 (88.9)		2 (0.1)	1,473 (100.0)		228	1,701
記載なし (%)	7 (9.0)	71 (91.0)			78 (100.0)		32	110
総計 (%)	169 (10.9)	1,380 (89.0)		2 (0.1)	1,551 (100.0)		260	1,811
平均	0.88	0.90		0.73	0.90		0.91	0.90
標準偏差	0.16	0.18		0.11	0.18		0.18	0.18

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査