

表 491 HDF希釈方法 透析前クレアチニン濃度(mg/dL)別 (オフラインHDF 男性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上)

透析前クレアチニン濃度	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
2未満(%)								
2～(%)	2 (20.0)	8 (80.0)			10 (100.0)		3	13
4～(%)	6 (12.2)	43 (87.8)			49 (100.0)		11	60
6～(%)	28 (12.0)	205 (88.0)			233 (100.0)		28	261
8～(%)	52 (10.6)	438 (89.4)			490 (100.0)		71	561
10～(%)	76 (11.7)	573 (88.3)			649 (100.0)		80	729
12～(%)	61 (12.3)	430 (87.0)		3 (0.6)	494 (100.0)		60	554
14～(%)	24 (10.9)	196 (89.1)			220 (100.0)		30	250
16～(%)	12 (13.2)	79 (86.8)			91 (100.0)		11	102
合計(%)	261 (11.7)	1,972 (88.2)		3 (0.1)	2,236 (100.0)		294	2,530
記載なし(%)	6 (9.2)	59 (90.8)			65 (100.0)		17	82
総計(%)	267 (11.6)	2,031 (88.3)		3 (0.1)	2,301 (100.0)		311	2,612
平均	11.03	11.03		13.33	11.04		10.86	11.02
標準偏差	2.83	2.76		0.64	2.77		2.86	2.78

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査