

表 493 HDF希釈方法 single pool Kt/V(Kt/Vsp)別 (オンラインHDF 男性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上)

single pool Kt/V (Kt/Vsp)	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
0.4未満 (%)	8 (100.0)				8 (100.0)		1	9
0.4～ (%)	13 (100.0)				13 (100.0)		1	14
0.6～ (%)	54 (96.4)	2 (3.6)			56 (100.0)		5	61
0.8～ (%)	457 (96.2)	16 (3.4)		2 (0.4)	475 (100.0)		33	508
1.0～ (%)	2,381 (97.0)	59 (2.4)		15 (0.6)	2,455 (100.0)		192	2,647
1.2～ (%)	5,716 (95.3)	226 (3.8)		56 (0.9)	5,998 (100.0)		476	6,474
1.4～ (%)	5,762 (94.8)	286 (4.7)	1 (0.0)	28 (0.5)	6,077 (100.0)		485	6,562
1.6～ (%)	2,946 (94.6)	160 (5.1)		9 (0.3)	3,115 (100.0)		258	3,373
1.8～ (%)	1,094 (93.7)	71 (6.1)		2 (0.2)	1,167 (100.0)		73	1,240
2.0～ (%)	580 (96.2)	22 (3.6)		1 (0.2)	603 (100.0)		25	628
合計 (%)	19,011 (95.2)	842 (4.2)	1 (0.0)	113 (0.6)	19,967 (100.0)		1,549	21,516
記載なし (%)	977 (91.4)	37 (3.5)		55 (5.1)	1,069 (100.0)		188	1,257
総計 (%)	19,988 (95.0)	879 (4.2)	1 (0.0)	168 (0.8)	21,036 (100.0)		1,737	22,773
平均	1.44	1.49	1.53	1.36	1.44		1.43	1.44
標準偏差	0.26	0.25		0.23	0.26		0.24	0.26

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査