

表 495 HDF希釈方法 nPCR(g/kg/day)別 (オンラインHDF 男性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上)

nPCR	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
0.4未満 (%)	19 (95.0)	1 (5.0)			20 (100.0)		3	23
0.4～ (%)	671 (96.3)	20 (2.9)		6 (0.9)	697 (100.0)		63	760
0.6～ (%)	5,686 (95.4)	238 (4.0)		37 (0.6)	5,961 (100.0)		486	6,447
0.8～ (%)	8,696 (95.1)	397 (4.3)	1 (0.0)	50 (0.5)	9,144 (100.0)		698	9,842
1.0～ (%)	3,368 (94.9)	165 (4.6)		16 (0.5)	3,549 (100.0)		261	3,810
1.2～ (%)	524 (95.6)	21 (3.8)		3 (0.5)	548 (100.0)		37	585
1.4～ (%)	58 (95.1)	2 (3.3)		1 (1.6)	61 (100.0)		4	65
1.6～ (%)	10 (100.0)				10 (100.0)			10
1.8～ (%)	1 (100.0)				1 (100.0)			1
2.0～ (%)	3 (100.0)				3 (100.0)			3
合計 (%)	19,036 (95.2)	844 (4.2)	1 (0.0)	113 (0.6)	19,994 (100.0)		1,552	21,546
記載なし (%)	952 (91.4)	35 (3.4)		55 (5.3)	1,042 (100.0)		185	1,227
総計 (%)	19,988 (95.0)	879 (4.2)	1 (0.0)	168 (0.8)	21,036 (100.0)		1,737	22,773
平均	0.87	0.88	0.89	0.85	0.87		0.86	0.87
標準偏差	0.17	0.15		0.17	0.17		0.17	0.17

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査