

表 496 HDF希釈方法 nPCR(g/kg/day)別 (オンラインHDF 女性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上)

nPCR	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
0.4未満 (%)	9 (90.0)	1 (10.0)			10 (100.0)		2	12
0.4～ (%)	339 (95.2)	17 (4.8)			356 (100.0)		39	395
0.6～ (%)	2,516 (94.2)	138 (5.2)		16 (0.6)	2,670 (100.0)		229	2,899
0.8～ (%)	4,680 (94.8)	233 (4.7)		24 (0.5)	4,937 (100.0)		427	5,364
1.0～ (%)	2,542 (94.9)	127 (4.7)		10 (0.4)	2,679 (100.0)		189	2,868
1.2～ (%)	532 (94.8)	24 (4.3)		5 (0.9)	561 (100.0)		51	612
1.4～ (%)	56 (96.6)	2 (3.4)			58 (100.0)		5	63
1.6～ (%)	11 (100.0)				11 (100.0)			11
1.8～ (%)	1 (100.0)				1 (100.0)			1
2.0～ (%)	1 (100.0)				1 (100.0)			1
合計 (%)	10,687 (94.7)	542 (4.8)		55 (0.5)	11,284 (100.0)		942	12,226
記載なし (%)	591 (89.1)	29 (4.4)		43 (6.5)	663 (100.0)		98	761
総計 (%)	11,278 (94.4)	571 (4.8)		98 (0.8)	11,947 (100.0)		1,040	12,987
平均	0.91	0.90		0.91	0.91		0.90	0.91
標準偏差	0.18	0.18		0.19	0.18		0.18	0.18

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査