

表 497 HDF希釈方法 透析前クレアチニン濃度(mg/dL)別 (オンラインHDF 男性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上)

透析前クレアチニン 濃度	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
2未満 (%)	3 (100.0)				3 (100.0)			3
2～ (%)	53 (94.6)	2 (3.6)		1 (1.8)	56 (100.0)		6	62
4～ (%)	306 (95.3)	14 (4.4)		1 (0.3)	321 (100.0)		30	351
6～ (%)	1,426 (94.8)	68 (4.5)		11 (0.7)	1,505 (100.0)		122	1,627
8～ (%)	3,782 (95.3)	161 (4.1)		24 (0.6)	3,967 (100.0)		274	4,241
10～ (%)	5,701 (95.3)	253 (4.2)	1 (0.0)	27 (0.5)	5,982 (100.0)		476	6,458
12～ (%)	4,913 (95.3)	212 (4.1)		31 (0.6)	5,156 (100.0)		440	5,596
14～ (%)	2,475 (95.8)	94 (3.6)		14 (0.5)	2,583 (100.0)		203	2,786
16～ (%)	951 (94.1)	54 (5.3)		6 (0.6)	1,011 (100.0)		82	1,093
合計 (%)	19,610 (95.3)	858 (4.2)	1 (0.0)	115 (0.6)	20,584 (100.0)		1,633	22,217
記載なし (%)	378 (83.6)	21 (4.6)		53 (11.7)	452 (100.0)		104	556
総計 (%)	19,988 (95.0)	879 (4.2)	1 (0.0)	168 (0.8)	21,036 (100.0)		1,737	22,773
平均	11.48	11.47	11.50	11.47	11.48		11.54	11.48
標準偏差	2.70	2.71		2.94	2.70		2.73	2.71

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査