

表 499 HDF希釈方法 治療方法別（透析患者全体）

治療方法	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
施設血液透析 (%)	1 (0.0)				1 (0.0)		248,724 (92.8)	248,725 (79.4)
血液透析濾過 (%)	37,670 (99.7)	5,658 (99.4)	45 (100.0)	1,696 (99.9)	45,069 (99.6)	2 (100.0)	8,705 (3.2)	53,776 (17.2)
血液濾過 (%)							16 (0.0)	16 (0.0)
血液吸着透析 (%)							1,376 (0.5)	1,376 (0.4)
在宅血液透析 (%)							555 (0.2)	555 (0.2)
腹膜透析 (%)	120 (0.3)	37 (0.6)		1 (0.1)	158 (0.3)		8,611 (3.2)	8,769 (2.8)
合計 (%)	37,791 (100.0)	5,695 (100.0)	45 (100.0)	1,697 (100.0)	45,228 (100.0)	2 (100.0)	267,987 (100.0)	313,217 (100.0)
記載なし								
総計	37,791	5,695	45	1,697	45,228	2	267,987	313,217

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査