

表 510 糖尿病の有無 体重減少率(%)別 (透析患者全体)

体重減少率	糖尿病なし	糖尿病あり	合計	不明	記載なし	総計
1.0未満 (%)	4,031 (3.3)	4,168 (3.2)	8,199 (3.3)	1,004 (3.7)		9,203 (3.3)
1.0～ (%)	5,668 (4.7)	6,479 (5.0)	12,147 (4.8)	1,351 (5.0)		13,498 (4.9)
2.0～ (%)	13,144 (10.9)	14,653 (11.3)	27,797 (11.1)	2,941 (10.9)	1 (50.0)	30,739 (11.1)
3.0～ (%)	24,288 (20.1)	27,905 (21.5)	52,193 (20.8)	5,331 (19.8)		57,524 (20.7)
4.0～ (%)	31,194 (25.8)	34,279 (26.5)	65,473 (26.1)	6,866 (25.5)	1 (50.0)	72,340 (26.1)
5.0～ (%)	23,877 (19.7)	24,380 (18.8)	48,257 (19.3)	5,308 (19.7)		53,565 (19.3)
6.0～ (%)	12,055 (10.0)	11,431 (8.8)	23,486 (9.4)	2,685 (10.0)		26,171 (9.4)
7.0～ (%)	4,452 (3.7)	4,175 (3.2)	8,627 (3.4)	1,001 (3.7)		9,628 (3.5)
8.0～ (%)	1,532 (1.3)	1,377 (1.1)	2,909 (1.2)	324 (1.2)		3,233 (1.2)
9.0～ (%)	778 (0.6)	726 (0.6)	1,504 (0.6)	156 (0.6)		1,660 (0.6)
合計 (%)	121,019 (100.0)	129,573 (100.0)	250,592 (100.0)	26,967 (100.0)	2 (100.0)	277,561 (100.0)
記載なし	5,448	15,297	20,745	14,906	5	35,656
総計	126,467	144,870	271,337	41,873	7	313,217
平均	4.39	4.31	4.35	4.36	3.42	4.35
標準偏差	1.76	1.72	1.74	1.77	1.02	1.74

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

\*糖尿病ありとは、原疾患が糖尿病性腎症または、糖尿病の既往がありの患者。

糖尿病なしとは、原疾患が糖尿病性腎症以外で且つ糖尿病の既往がなしの患者。

記載なしとは、原疾患と糖尿病の既往いずれも記載のなかった患者。

不明とは、上記以外。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査