

表 511 糖尿病の有無 %クレアチニン産生速度(%)別 (透析患者全体)

%クレアチニン 産生速度	糖尿病なし	糖尿病あり	合計	不明	記載なし	総計
60未満 (%)	10,952 (9.6)	21,014 (17.2)	31,966 (13.5)	2,527 (10.1)		34,493 (13.2)
60～ (%)	5,995 (5.2)	11,280 (9.2)	17,275 (7.3)	1,269 (5.1)		18,544 (7.1)
70～ (%)	8,571 (7.5)	14,431 (11.8)	23,002 (9.7)	1,948 (7.8)		24,950 (9.5)
80～ (%)	11,951 (10.4)	17,238 (14.1)	29,189 (12.3)	2,630 (10.5)		31,819 (12.2)
90～ (%)	15,456 (13.5)	18,025 (14.8)	33,481 (14.1)	3,410 (13.7)		36,891 (14.1)
100～ (%)	18,075 (15.8)	16,007 (13.1)	34,082 (14.4)	3,763 (15.1)		37,845 (14.5)
110～ (%)	17,273 (15.1)	11,825 (9.7)	29,098 (12.3)	3,798 (15.2)		32,896 (12.6)
120～ (%)	13,163 (11.5)	6,908 (5.7)	20,071 (8.5)	2,855 (11.4)		22,926 (8.8)
130～ (%)	7,722 (6.7)	3,248 (2.7)	10,970 (4.6)	1,595 (6.4)		12,565 (4.8)
140～ (%)	5,399 (4.7)	2,160 (1.8)	7,559 (3.2)	1,163 (4.7)		8,722 (3.3)
合計 (%)	114,557 (100.0)	122,136 (100.0)	236,693 (100.0)	24,958 (100.0)		261,651 (100.0)
記載なし	11,910	22,734	34,644	16,915	7	51,566
総計	126,467	144,870	271,337	41,873	7	313,217
平均	99.15	86.56	92.65	98.61		93.22
標準偏差	27.99	27.66	28.52	28.34		28.56

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

*糖尿病ありとは、原疾患が糖尿病性腎症または、糖尿病の既往がありの患者。

糖尿病なしとは、原疾患が糖尿病性腎症以外で且つ糖尿病の既往がなしの患者。

記載なしとは、原疾患と糖尿病の既往いずれも記載のなかった患者。

不明とは、上記以外。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査