

表 517 治療方法 併用の状況別（透析患者全体、糖尿病あり患者）

併用の状況	施設血液透析	Off-line HDF	On-line HDF	Push/Pull HDF	ハイオフィльтраーション	IHDF	血液濾過	血液吸着透析 （リクセル等使用）	在宅血液透析	腹膜透析 （CAPD）	腹膜透析 （APD）	腹膜透析 （CCPD）	合計	記載なし	総計
HD（F）単独	118,603	2,004	18,453	48	124	1,759	6	139	117	1			141,254		141,254
（％）	(99.9)	(99.9)	(99.9)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(0.1)			(97.5)		(97.5)
PD単独										1,638	963	280	2,881		2,881
（％）										(84.7)	(83.0)	(68.1)	(2.0)		(2.0)
HD（F）単独、PDカテあり	58	2	8										68		68
（％）	(0.0)	(0.1)	(0.0)										(0.0)		(0.0)
PD、HD併用週1										254	180	117	551		551
HD（F）										(13.1)	(15.5)	(28.5)	(0.4)		(0.4)
（％）															
PD、HD併用週2	13		3							29	11	9	65		65
HD（F）										(1.5)	(0.9)	(2.2)	(0.0)		(0.0)
（％）	(0.0)		(0.0)												
PD、HD併用週3	12		1										13		13
HD（F）													(0.0)		(0.0)
（％）	(0.0)		(0.0)												
PD、HD併用週4															
HD（F）															
（％）															
PD、HD併用その他			2							11	6	5	24		24
（％）			(0.0)							(0.6)	(0.5)	(1.2)	(0.0)		(0.0)
合計	118,686	2,006	18,467	48	124	1,759	6	139	117	1,933	1,160	411	144,856		144,856
（％）	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		(100.0)
不明	9	1	3										13		13
記載なし	1												1		1
総計	118,696	2,007	18,470	48	124	1,759	6	139	117	1,933	1,160	411	144,870		144,870

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する％です。
*腹膜透析（CCPD）は、APDと手動のバック交換の両方を行うもの
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査