

表 529 治療方法(新分類)併用の状況別(血液透析濾過患者)

併用の状況	施設血液透析	Off-line HDF	On-line HDF	Push/Pull HDF	ハイオフィルテーション	IHDF	血液濾過	血液吸着透析 (リクセル等使用)	在宅血液透析	腹膜透析 (CAPD)	腹膜透析 (APD)	腹膜透析 (CCPD)	合計	記載なし	総計
HD(F)単独 (%)		5,322 (99.8)	44,492 (99.9)	110 (100.0)	267 (100.0)	3,537 (99.9)							53,728 (99.9)		53,728 (99.9)
PD単独 (%)		7 (0.1)	19 (0.0)			3 (0.1)							29 (0.1)		29 (0.1)
HD(F)単独,PDカテあり (%)															
PD,HD併用週1 HD(F) (%)		1 (0.0)	7 (0.0)										8 (0.0)		8 (0.0)
PD,HD併用週2 HD(F) (%)													1 (0.0)		1 (0.0)
PD,HD併用週3 HD(F) (%)															
PD,HD併用週4 HD(F) (%)															
PD,HD併用その他 (%)		1 (0.0)	3 (0.0)										4 (0.0)		4 (0.0)
合計 (%)		5,331 (100.0)	44,522 (100.0)	110 (100.0)	267 (100.0)	3,540 (100.0)							53,770 (100.0)		53,770 (100.0)
不明		1	5										6		6
記載なし															
総計		5,332	44,527	110	267	3,540							53,776		53,776

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

*腹膜透析(CCPD)は、APDと手動のバック交換の両方を行うもの

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査