

表 542 HDF希釈方法 透析後体重(kg)別 (オフラインHDF 男性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上)

透析後体重	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
20未満 (%)		1 (100.0)			1 (100.0)			1
20~ (%)								
30~ (%)	5 (14.3)	30 (85.7)			35 (100.0)		9	44
40~ (%)	56 (14.4)	334 (85.6)			390 (100.0)		63	453
50~ (%)	94 (11.7)	711 (88.2)		1 (0.1)	806 (100.0)		107	913
60~ (%)	68 (11.0)	548 (88.8)		1 (0.2)	617 (100.0)		78	695
70~ (%)	25 (10.4)	215 (89.6)			240 (100.0)		20	260
80~ (%)	10 (10.8)	82 (88.2)		1 (1.1)	93 (100.0)		11	104
90~ (%)	3 (7.9)	35 (92.1)			38 (100.0)		5	43
100~ (%)	1 (12.5)	7 (87.5)			8 (100.0)		2	10
110~ (%)		3 (100.0)			3 (100.0)		1	4
120~ (%)	1 (16.7)	5 (83.3)			6 (100.0)			6
合計 (%)	263 (11.8)	1,971 (88.1)		3 (0.1)	2,237 (100.0)		296	2,533
記載なし (%)	4 (6.3)	60 (93.8)			64 (100.0)		15	79
総計 (%)	267 (11.6)	2,031 (88.3)		3 (0.1)	2,301 (100.0)		311	2,612
平均	58.86	60.38		69.87	60.21		58.57	60.02
標準偏差	12.14	12.38		10.15	12.36		12.38	12.37

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査