

表 548 HDF希釈方法 透析後体重(kg)別（オンラインHDF 男性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上）

透析後体重	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
20未満	6				6		1	7
(%)	(100.0)				(100.0)			
20～	3	1			4		1	5
(%)	(75.0)	(25.0)			(100.0)			
30～	220	7		1	228		19	247
(%)	(96.5)	(3.1)		(0.4)	(100.0)			
40～	2,630	123		18	2,771		200	2,971
(%)	(94.9)	(4.4)		(0.6)	(100.0)			
50～	6,984	314		42	7,340		563	7,903
(%)	(95.1)	(4.3)		(0.6)	(100.0)			
60～	5,670	232	1	26	5,929		495	6,424
(%)	(95.6)	(3.9)	(0.0)	(0.4)	(100.0)			
70～	2,591	114		19	2,724		238	2,962
(%)	(95.1)	(4.2)		(0.7)	(100.0)			
80～	991	42		6	1,039		76	1,115
(%)	(95.4)	(4.0)		(0.6)	(100.0)			
90～	377	22		3	402		26	428
(%)	(93.8)	(5.5)		(0.7)	(100.0)			
100～	128	3		1	132		7	139
(%)	(97.0)	(2.3)		(0.8)	(100.0)			
110～	47	1			48		4	52
(%)	(97.9)	(2.1)			(100.0)			
120～	36	1			37		3	40
(%)	(97.3)	(2.7)			(100.0)			
合計	19,683	860	1	116	20,660		1,633	22,293
(%)	(95.3)	(4.2)	(0.0)	(0.6)	(100.0)			
記載なし	305	19		52	376		104	480
(%)	(81.1)	(5.1)		(13.8)	(100.0)			
総計	19,988	879	1	168	21,036		1,737	22,773
(%)	(95.0)	(4.2)	(0.0)	(0.8)	(100.0)			
平均	61.73	61.36	65.40	61.86	61.71		62.06	61.74
標準偏差	12.52	12.45		12.73	12.52		12.21	12.49

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査