

表 628 糖尿病の既往 原疾患別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

原疾患	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
慢性糸球体腎炎	12,838	1,587	14,425	4	3,033	17,462
(%)	(89.0)	(11.0)	(100.0)			
慢性腎盂腎炎	358	45	403		81	484
(%)	(88.8)	(11.2)	(100.0)			
急速進行性糸球体腎炎	242	65	307		46	353
(%)	(78.8)	(21.2)	(100.0)			
妊娠腎/妊娠中毒症	292	23	315	1	85	401
(%)	(92.7)	(7.3)	(100.0)			
その他の分類不能の腎炎	191	21	212		49	261
(%)	(90.1)	(9.9)	(100.0)			
多発性嚢胞腎	1,379	163	1,542	1	337	1,880
(%)	(89.4)	(10.6)	(100.0)			
腎硬化症	2,560	616	3,176	1	643	3,820
(%)	(80.6)	(19.4)	(100.0)			
悪性高血圧	277	45	322		69	391
(%)	(86.0)	(14.0)	(100.0)			
糖尿病性腎症		16,670	16,670		290	16,960
(%)		(100.0)	(100.0)			
SLE腎炎	317	50	367		59	426
(%)	(86.4)	(13.6)	(100.0)			
アミロイド腎	52	17	69		5	74
(%)	(75.4)	(24.6)	(100.0)			
痛風腎	125	10	135		31	166
(%)	(92.6)	(7.4)	(100.0)			
先天性代謝異常による腎不全	32	3	35		14	49
(%)	(91.4)	(8.6)	(100.0)			
腎・尿路結核	21	4	25		6	31
(%)	(84.0)	(16.0)	(100.0)			
腎・尿路結石	56	9	65		14	79
(%)	(86.2)	(13.8)	(100.0)			
腎・尿路腫瘍	79	20	99		20	119
(%)	(79.8)	(20.2)	(100.0)			
閉塞性尿路障害	80	7	87		17	104
(%)	(92.0)	(8.0)	(100.0)			
骨髄腫	21	7	28	1	4	33
(%)	(75.0)	(25.0)	(100.0)			
腎形成不全	107	6	113		23	136
(%)	(94.7)	(5.3)	(100.0)			
不明	2,971	848	3,819	5	879	4,703
(%)	(77.8)	(22.2)	(100.0)			
再導入	360	45	405		78	483
(%)	(88.9)	(11.1)	(100.0)			
その他	719	245	964	3	193	1,160
(%)	(74.6)	(25.4)	(100.0)			
合計	23,077	20,506	43,583	16	5,976	49,575
(%)	(52.9)	(47.1)	(100.0)			
記載なし	4	2	6			6
(%)	(66.7)	(33.3)	(100.0)			
総計	23,081	20,508	43,589	16	5,976	49,581
(%)	(53.0)	(47.0)	(100.0)			

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査