

表 696 心筋梗塞の既往 年齢(歳)別 (透析患者全体)

年齢	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
15歳未満 (%)	69 (98.6)	1 (1.4)	70 (100.0)		33	103
15歳～ (%)	707 (98.7)	9 (1.3)	716 (100.0)	2	252	970
30歳～ (%)	10,156 (97.1)	307 (2.9)	10,463 (100.0)	24	3,369	13,856
45歳～ (%)	39,512 (92.8)	3,050 (7.2)	42,562 (100.0)	130	13,649	56,341
60歳～ (%)	95,426 (88.8)	12,055 (11.2)	107,481 (100.0)	337	33,816	141,634
75歳～ (%)	62,865 (87.8)	8,705 (12.2)	71,570 (100.0)	278	22,900	94,748
90歳～ (%)	3,728 (90.1)	411 (9.9)	4,139 (100.0)	26	1,395	5,560
合計 (%)	212,463 (89.6)	24,538 (10.4)	237,001 (100.0)	797	75,414	313,212
不明 (%)					4	4
記載なし (%)	1 (100.0)		1 (100.0)			1
総計 (%)	212,464 (89.6)	24,538 (10.4)	237,002 (100.0)	797	75,418	313,217
平均	67.54	70.55	67.85	69.36	67.86	67.86
標準偏差	12.65	10.33	12.47	12.47	12.57	12.49

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査