

表 763 心筋梗塞の既往 透析歴(年)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

| 透析歴         | 既往なし             | 既往あり            | 合計                | 不明   | 記載なし  | 総計     |
|-------------|------------------|-----------------|-------------------|------|-------|--------|
| 2年未満<br>(%) | 4,720<br>(92.1)  | 403<br>(7.9)    | 5,123<br>(100.0)  | 13   | 1,269 | 6,405  |
| 2年～<br>(%)  | 7,898<br>(89.2)  | 961<br>(10.8)   | 8,859<br>(100.0)  | 14   | 2,196 | 11,069 |
| 5年～<br>(%)  | 8,939<br>(87.7)  | 1,250<br>(12.3) | 10,189<br>(100.0) | 11   | 2,574 | 12,774 |
| 10年～<br>(%) | 5,422<br>(89.0)  | 672<br>(11.0)   | 6,094<br>(100.0)  | 10   | 1,459 | 7,563  |
| 15年～<br>(%) | 3,438<br>(90.8)  | 349<br>(9.2)    | 3,787<br>(100.0)  | 3    | 906   | 4,696  |
| 20年～<br>(%) | 2,224<br>(91.0)  | 220<br>(9.0)    | 2,444<br>(100.0)  | 7    | 607   | 3,058  |
| 25年～<br>(%) | 1,390<br>(90.4)  | 148<br>(9.6)    | 1,538<br>(100.0)  | 3    | 389   | 1,930  |
| 30年～<br>(%) | 851<br>(89.7)    | 98<br>(10.3)    | 949<br>(100.0)    | 2    | 246   | 1,197  |
| 35年～<br>(%) | 446<br>(90.3)    | 48<br>(9.7)     | 494<br>(100.0)    | 1    | 143   | 638    |
| 40年～<br>(%) | 150<br>(90.9)    | 15<br>(9.1)     | 165<br>(100.0)    |      | 32    | 197    |
| 合計<br>(%)   | 35,478<br>(89.5) | 4,164<br>(10.5) | 39,642<br>(100.0) | 64   | 9,821 | 49,527 |
| 不明<br>(%)   | 8<br>(80.0)      | 2<br>(20.0)     | 10<br>(100.0)     |      | 44    | 54     |
| 記載なし<br>(%) |                  |                 |                   |      |       |        |
| 総計<br>(%)   | 35,486<br>(89.5) | 4,166<br>(10.5) | 39,652<br>(100.0) | 64   | 9,865 | 49,581 |
| 平均          | 9.70             | 9.50            | 9.68              | 9.67 | 9.70  | 9.68   |
| 標準偏差        | 8.73             | 8.30            | 8.69              | 9.61 | 8.77  | 8.71   |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査