

表 826 脳出血の既往 治療方法別（透析患者全体）

| 治療方法          | 既往なし              | 既往あり            | 合計                 | 不明  | 記載なし   | 総計      |
|---------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----|--------|---------|
| 施設血液透析<br>(%) | 175,674<br>(93.4) | 12,426<br>(6.6) | 188,100<br>(100.0) | 580 | 60,045 | 248,725 |
| 血液透析濾過<br>(%) | 37,754<br>(93.7)  | 2,527<br>(6.3)  | 40,281<br>(100.0)  | 133 | 13,362 | 53,776  |
| 血液濾過<br>(%)   | 10<br>(90.9)      | 1<br>(9.1)      | 11<br>(100.0)      |     | 5      | 16      |
| 血液吸着透析<br>(%) | 1,076<br>(94.4)   | 64<br>(5.6)     | 1,140<br>(100.0)   |     | 236    | 1,376   |
| 在宅血液透析<br>(%) | 390<br>(97.7)     | 9<br>(2.3)      | 399<br>(100.0)     | 1   | 155    | 555     |
| 腹膜透析<br>(%)   | 5,514<br>(95.5)   | 257<br>(4.5)    | 5,771<br>(100.0)   | 22  | 2,976  | 8,769   |
| 合計<br>(%)     | 220,418<br>(93.5) | 15,284<br>(6.5) | 235,702<br>(100.0) | 736 | 76,779 | 313,217 |
| 記載なし<br>(%)   |                   |                 |                    |     |        |         |
| 総計<br>(%)     | 220,418<br>(93.5) | 15,284<br>(6.5) | 235,702<br>(100.0) | 736 | 76,779 | 313,217 |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査