

表 896 脳出血の既往 原疾患別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

原疾患	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
慢性糸球体腎炎	13,249	823	14,072	32	3,358	17,462
(%)	(94.2)	(5.8)	(100.0)			
慢性腎盂腎炎	374	17	391	1	92	484
(%)	(95.7)	(4.3)	(100.0)			
急速進行性糸球体腎炎	274	22	296	1	56	353
(%)	(92.6)	(7.4)	(100.0)			
妊娠腎/妊娠中毒症	279	18	297	1	103	401
(%)	(93.9)	(6.1)	(100.0)			
その他の分類不能の腎炎	192	11	203		58	261
(%)	(94.6)	(5.4)	(100.0)			
多発性嚢胞腎	1,350	180	1,530	4	346	1,880
(%)	(88.2)	(11.8)	(100.0)			
腎硬化症	2,797	244	3,041	13	766	3,820
(%)	(92.0)	(8.0)	(100.0)			
悪性高血圧	289	31	320		71	391
(%)	(90.3)	(9.7)	(100.0)			
糖尿病性腎症	12,624	757	13,381	53	3,526	16,960
(%)	(94.3)	(5.7)	(100.0)			
SLE腎炎	344	18	362	1	63	426
(%)	(95.0)	(5.0)	(100.0)			
アミロイド腎	64	2	66		8	74
(%)	(97.0)	(3.0)	(100.0)			
痛風腎	128	5	133		33	166
(%)	(96.2)	(3.8)	(100.0)			
先天性代謝異常による腎不全	33	1	34		15	49
(%)	(97.1)	(2.9)	(100.0)			
腎・尿路結核	23	2	25		6	31
(%)	(92.0)	(8.0)	(100.0)			
腎・尿路結石	58	7	65		14	79
(%)	(89.2)	(10.8)	(100.0)			
腎・尿路腫瘍	91	9	100		19	119
(%)	(91.0)	(9.0)	(100.0)			
閉塞性尿路障害	79	6	85		19	104
(%)	(92.9)	(7.1)	(100.0)			
骨髄腫	24		24	1	8	33
(%)	(100.0)		(100.0)			
腎形成不全	108	5	113		23	136
(%)	(95.6)	(4.4)	(100.0)			
不明	3,318	221	3,539	13	1,151	4,703
(%)	(93.8)	(6.2)	(100.0)			
再導入	368	24	392	1	90	483
(%)	(93.9)	(6.1)	(100.0)			
その他	861	51	912	3	245	1,160
(%)	(94.4)	(5.6)	(100.0)			
合計	36,927	2,454	39,381	124	10,070	49,575
(%)	(93.8)	(6.2)	(100.0)			
記載なし	6		6			6
(%)	(100.0)		(100.0)			
総計	36,933	2,454	39,387	124	10,070	49,581
(%)	(93.8)	(6.2)	(100.0)			

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査