

表 957 脳梗塞の既往 治療方法(新分類)別 (透析患者全体)

治療方法 (新分類)	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
施設血液透析	155,025	36,469	191,494	573	56,658	248,725
(%)	(81.0)	(19.0)	(100.0)			
Off-line HDF	3,228	794	4,022	14	1,296	5,332
(%)	(80.3)	(19.7)	(100.0)			
On-line HDF	28,167	5,693	33,860	69	10,598	44,527
(%)	(83.2)	(16.8)	(100.0)			
Push/Pull HDF	70	12	82		28	110
(%)	(85.4)	(14.6)	(100.0)			
ハイオフィльтраーション	177	35	212	1	54	267
(%)	(83.5)	(16.5)	(100.0)			
IHDF	2,125	685	2,810	51	679	3,540
(%)	(75.6)	(24.4)	(100.0)			
血液濾過	8	3	11		5	16
(%)	(72.7)	(27.3)	(100.0)			
血液吸着透析 (リクセル等使用)	958	193	1,151	1	224	1,376
(%)	(83.2)	(16.8)	(100.0)			
在宅血液透析	382	20	402	1	152	555
(%)	(95.0)	(5.0)	(100.0)			
腹膜透析 (CAPD)	2,775	407	3,182	10	1,710	4,902
(%)	(87.2)	(12.8)	(100.0)			
腹膜透析 (APD)	1,654	247	1,901	9	865	2,775
(%)	(87.0)	(13.0)	(100.0)			
腹膜透析 (CCPD)	693	77	770	3	319	1,092
(%)	(90.0)	(10.0)	(100.0)			
合計	195,262	44,635	239,897	732	72,588	313,217
(%)	(81.4)	(18.6)	(100.0)			
記載なし						
(%)						
総計	195,262	44,635	239,897	732	72,588	313,217
(%)	(81.4)	(18.6)	(100.0)			

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

*腹膜透析(CCPD)は、APDと手動のバック交換の両方を行うもの

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査