

表 1024 脳梗塞の既往 原疾患別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

原疾患	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
慢性糸球体腎炎	12,243	1,977	14,220	39	3,203	17,462
(%)	(86.1)	(13.9)	(100.0)			
慢性腎盂腎炎	346	49	395	1	88	484
(%)	(87.6)	(12.4)	(100.0)			
急速進行性糸球体腎炎	255	43	298	1	54	353
(%)	(85.6)	(14.4)	(100.0)			
妊娠腎/妊娠中毒症	264	47	311		90	401
(%)	(84.9)	(15.1)	(100.0)			
その他の分類不能の腎炎	188	16	204		57	261
(%)	(92.2)	(7.8)	(100.0)			
多発性嚢胞腎	1,279	259	1,538	3	339	1,880
(%)	(83.2)	(16.8)	(100.0)			
腎硬化症	2,483	625	3,108	13	699	3,820
(%)	(79.9)	(20.1)	(100.0)			
悪性高血圧	284	36	320		71	391
(%)	(88.8)	(11.3)	(100.0)			
糖尿病性腎症	10,640	3,063	13,703	47	3,210	16,960
(%)	(77.6)	(22.4)	(100.0)			
SLE腎炎	319	42	361	1	64	426
(%)	(88.4)	(11.6)	(100.0)			
アミロイド腎	61	6	67		7	74
(%)	(91.0)	(9.0)	(100.0)			
痛風腎	114	19	133		33	166
(%)	(85.7)	(14.3)	(100.0)			
先天性代謝異常による腎不全	32	2	34		15	49
(%)	(94.1)	(5.9)	(100.0)			
腎・尿路結核	21	4	25		6	31
(%)	(84.0)	(16.0)	(100.0)			
腎・尿路結石	53	14	67		12	79
(%)	(79.1)	(20.9)	(100.0)			
腎・尿路腫瘍	86	14	100		19	119
(%)	(86.0)	(14.0)	(100.0)			
閉塞性尿路障害	74	13	87		17	104
(%)	(85.1)	(14.9)	(100.0)			
骨髄腫	24		24	1	8	33
(%)	(100.0)		(100.0)			
腎形成不全	105	7	112		24	136
(%)	(93.8)	(6.3)	(100.0)			
不明	3,020	579	3,599	14	1,090	4,703
(%)	(83.9)	(16.1)	(100.0)			
再導入	354	42	396	1	86	483
(%)	(89.4)	(10.6)	(100.0)			
その他	792	133	925	3	232	1,160
(%)	(85.6)	(14.4)	(100.0)			
合計	33,037	6,990	40,027	124	9,424	49,575
(%)	(82.5)	(17.5)	(100.0)			
記載なし	5	1	6			6
(%)	(83.3)	(16.7)	(100.0)			
総計	33,042	6,991	40,033	124	9,424	49,581
(%)	(82.5)	(17.5)	(100.0)			

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査