

表 1083 四肢切断の有無 治療方法(新分類)別(透析患者全体)

治療方法 (新分類)	切断なし	切断あり	合計	不明	記載なし	総計
施設血液透析	181,765	7,639	189,404	223	59,098	248,725
(%)	(96.0)	(4.0)	(100.0)			
Off-line HDF	3,774	183	3,957	6	1,369	5,332
(%)	(95.4)	(4.6)	(100.0)			
On-line HDF	32,497	1,136	33,633	4	10,890	44,527
(%)	(96.6)	(3.4)	(100.0)			
Push/Pull HDF	76	5	81		29	110
(%)	(93.8)	(6.2)	(100.0)			
ハイオフィльтраーション	193	15	208	1	58	267
(%)	(92.8)	(7.2)	(100.0)			
IHDF	2,697	101	2,798		742	3,540
(%)	(96.4)	(3.6)	(100.0)			
血液濾過	10	2	12		4	16
(%)	(83.3)	(16.7)	(100.0)			
血液吸着透析 (リクセル等使用)	1,118	29	1,147		229	1,376
(%)	(97.5)	(2.5)	(100.0)			
在宅血液透析	400	6	406		149	555
(%)	(98.5)	(1.5)	(100.0)			
腹膜透析 (CAPD)	3,072	52	3,124	4	1,774	4,902
(%)	(98.3)	(1.7)	(100.0)			
腹膜透析 (APD)	1,854	31	1,885	4	886	2,775
(%)	(98.4)	(1.6)	(100.0)			
腹膜透析 (CCPD)	757	9	766	1	325	1,092
(%)	(98.8)	(1.2)	(100.0)			
合計	228,213	9,208	237,421	243	75,553	313,217
(%)	(96.1)	(3.9)	(100.0)			
記載なし (%)						
総計	228,213	9,208	237,421	243	75,553	313,217
(%)	(96.1)	(3.9)	(100.0)			

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

*腹膜透析(CCPD)は、APDと手動のバック交換の両方を行うもの

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査