

表 1086 四肢切断の有無 年齢(歳)別 (透析患者全体)

年齢	切断なし	切断あり	合計	不明	記載なし	総計
15歳未満	69		69		34	103
(%)	(100.0)		(100.0)			
15歳～	721	3	724		246	970
(%)	(99.6)	(0.4)	(100.0)			
30歳～	10,325	243	10,568	9	3,279	13,856
(%)	(97.7)	(2.3)	(100.0)			
45歳～	40,970	1,948	42,918	34	13,389	56,341
(%)	(95.5)	(4.5)	(100.0)			
60歳～	102,878	4,760	107,638	101	33,895	141,634
(%)	(95.6)	(4.4)	(100.0)			
75歳～	69,180	2,175	71,355	90	23,303	94,748
(%)	(97.0)	(3.0)	(100.0)			
90歳～	4,069	79	4,148	9	1,403	5,560
(%)	(98.1)	(1.9)	(100.0)			
合計	228,212	9,208	237,420	243	75,549	313,212
(%)	(96.1)	(3.9)	(100.0)			
不明					4	4
(%)						
記載なし	1		1			1
(%)	(100.0)		(100.0)			
総計	228,213	9,208	237,421	243	75,553	313,217
(%)	(96.1)	(3.9)	(100.0)			
平均	67.85	66.64	67.80	70.09	68.03	67.86
標準偏差	12.54	10.83	12.48	12.93	12.52	12.49

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査