

表 1147 四肢切断の有無 透析歴(年)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

透析歴	切断なし	切断あり	合計	不明	記載なし	総計
2年未満 (%)	5,070 (97.7)	120 (2.3)	5,190 (100.0)		1,215	6,405
2年～ (%)	8,587 (96.8)	283 (3.2)	8,870 (100.0)	3	2,196	11,069
5年～ (%)	9,781 (95.5)	461 (4.5)	10,242 (100.0)	2	2,530	12,774
10年～ (%)	5,806 (95.1)	301 (4.9)	6,107 (100.0)	3	1,453	7,563
15年～ (%)	3,658 (96.9)	117 (3.1)	3,775 (100.0)	1	920	4,696
20年～ (%)	2,400 (97.8)	54 (2.2)	2,454 (100.0)	1	603	3,058
25年～ (%)	1,506 (98.2)	28 (1.8)	1,534 (100.0)	1	395	1,930
30年～ (%)	930 (98.5)	14 (1.5)	944 (100.0)		253	1,197
35年～ (%)	488 (98.2)	9 (1.8)	497 (100.0)		141	638
40年～ (%)	161 (98.2)	3 (1.8)	164 (100.0)		33	197
合計 (%)	38,387 (96.5)	1,390 (3.5)	39,777 (100.0)	11	9,739	49,527
不明 (%)	8 (80.0)	2 (20.0)	10 (100.0)		44	54
記載なし (%)						
総計 (%)	38,395 (96.5)	1,392 (3.5)	39,787 (100.0)	11	9,783	49,581
平均	9.68	8.87	9.66	11.09	9.79	9.68
標準偏差	8.74	6.88	8.68	8.32	8.81	8.71

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査