

表 1148 四肢切断の有無 原疾患別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

原疾患	切断なし	切断あり	合計	不明	記載なし	総計
慢性糸球体腎炎	14,004	170	14,174	4	3,284	17,462
(%)	(98.8)	(1.2)	(100.0)			
慢性腎盂腎炎	390	8	398		86	484
(%)	(98.0)	(2.0)	(100.0)			
急速進行性糸球体腎炎	293	2	295		58	353
(%)	(99.3)	(0.7)	(100.0)			
妊娠腎/妊娠中毒症	301	5	306		95	401
(%)	(98.4)	(1.6)	(100.0)			
その他の分類不能の腎炎	202	1	203		58	261
(%)	(99.5)	(0.5)	(100.0)			
多発性嚢胞腎	1,513	10	1,523	1	356	1,880
(%)	(99.3)	(0.7)	(100.0)			
腎硬化症	3,011	40	3,051		769	3,820
(%)	(98.7)	(1.3)	(100.0)			
悪性高血圧	312	5	317		74	391
(%)	(98.4)	(1.6)	(100.0)			
糖尿病性腎症	12,573	1,037	13,610	5	3,345	16,960
(%)	(92.4)	(7.6)	(100.0)			
SLE腎炎	355	5	360	1	65	426
(%)	(98.6)	(1.4)	(100.0)			
アミロイド腎	66		66		8	74
(%)	(100.0)		(100.0)			
痛風腎	134		134		32	166
(%)	(100.0)		(100.0)			
先天性代謝異常による腎不全	32	1	33		16	49
(%)	(97.0)	(3.0)	(100.0)			
腎・尿路結核	23	1	24		7	31
(%)	(95.8)	(4.2)	(100.0)			
腎・尿路結石	61	3	64		15	79
(%)	(95.3)	(4.7)	(100.0)			
腎・尿路腫瘍	99	2	101		18	119
(%)	(98.0)	(2.0)	(100.0)			
閉塞性尿路障害	86		86		18	104
(%)	(100.0)		(100.0)			
骨髄腫	25		25		8	33
(%)	(100.0)		(100.0)			
腎形成不全	110	2	112		24	136
(%)	(98.2)	(1.8)	(100.0)			
不明	3,511	66	3,577		1,126	4,703
(%)	(98.2)	(1.8)	(100.0)			
再導入	385	11	396		87	483
(%)	(97.2)	(2.8)	(100.0)			
その他	903	23	926		234	1,160
(%)	(97.5)	(2.5)	(100.0)			
合計	38,389	1,392	39,781	11	9,783	49,575
(%)	(96.5)	(3.5)	(100.0)			
記載なし	6		6			6
(%)	(100.0)		(100.0)			
総計	38,395	1,392	39,787	11	9,783	49,581
(%)	(96.5)	(3.5)	(100.0)			

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査