

表 1181 四肢切断の有無 原疾患別（腹膜透析患者）

原疾患	切断なし	切断あり	合計	不明	記載なし	総計
慢性糸球体腎炎	1,878	10	1,888	4	938	2,830
(%)	(99.5)	(0.5)	(100.0)			
慢性腎盂腎炎	74	1	75		22	97
(%)	(98.7)	(1.3)	(100.0)			
急速進行性糸球体腎炎	38	1	39		27	66
(%)	(97.4)	(2.6)	(100.0)			
妊娠腎/妊娠中毒症	24		24		3	27
(%)	(100.0)		(100.0)			
その他の分類不能の腎炎	55		55		23	78
(%)	(100.0)		(100.0)			
多発性嚢胞腎	168		168		95	263
(%)	(100.0)		(100.0)			
腎硬化症	707	10	717		378	1,095
(%)	(98.6)	(1.4)	(100.0)			
悪性高血圧	67		67		40	107
(%)	(100.0)		(100.0)			
糖尿病性腎症	1,766	60	1,826	2	971	2,799
(%)	(96.7)	(3.3)	(100.0)			
SLE腎炎	31		31		15	46
(%)	(100.0)		(100.0)			
アミロイド腎	10		10		5	15
(%)	(100.0)		(100.0)			
痛風腎	26		26		6	32
(%)	(100.0)		(100.0)			
先天性代謝異常による腎不全	10		10		7	17
(%)	(100.0)		(100.0)			
腎・尿路結核					2	2
(%)						
腎・尿路結石	15	1	16		5	21
(%)	(93.8)	(6.3)	(100.0)			
腎・尿路腫瘍	11		11		3	14
(%)	(100.0)		(100.0)			
閉塞性尿路障害	14		14		7	21
(%)	(100.0)		(100.0)			
骨髄腫	3		3		4	7
(%)	(100.0)		(100.0)			
腎形成不全	49	1	50		22	72
(%)	(98.0)	(2.0)	(100.0)			
不明	548	4	552	3	287	842
(%)	(99.3)	(0.7)	(100.0)			
再導入	27	1	28		27	55
(%)	(96.4)	(3.6)	(100.0)			
その他	162	3	165		98	263
(%)	(98.2)	(1.8)	(100.0)			
合計	5,683	92	5,775	9	2,985	8,769
(%)	(98.4)	(1.6)	(100.0)			
記載なし						
(%)						
総計	5,683	92	5,775	9	2,985	8,769
(%)	(98.4)	(1.6)	(100.0)			

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査