

表 1204 大腿骨近位部骨折の既往 治療方法別（透析患者全体）

| 治療方法 | 既往なし | 既往あり | 合計 | 不明 | 記載なし | 総計 |
|---------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----|--------|---------|
| 施設血液透析 (%) | 178,612 (95.1) | 9,157 (4.9) | 187,769 (100.0) | 380 | 60,576 | 248,725 |
| 血液透析濾過 (%) | 38,517 (96.0) | 1,605 (4.0) | 40,122 (100.0) | 44 | 13,610 | 53,776 |
| 血液濾過 (%) | 10 (90.9) | 1 (9.1) | 11 (100.0) | | 5 | 16 |
| 血液吸着透析 (%) | 1,038 (90.8) | 105 (9.2) | 1,143 (100.0) | 2 | 231 | 1,376 |
| 在宅血液透析 (%) | 391 (98.5) | 6 (1.5) | 397 (100.0) | | 158 | 555 |
| 腹膜透析 (%) | 5,604 (97.6) | 137 (2.4) | 5,741 (100.0) | 16 | 3,012 | 8,769 |
| 合計 (%) | 224,172 (95.3) | 11,011 (4.7) | 235,183 (100.0) | 442 | 77,592 | 313,217 |
| 記載なし (%) | | | | | | |
| 総計 (%) | 224,172 (95.3) | 11,011 (4.7) | 235,183 (100.0) | 442 | 77,592 | 313,217 |

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査