

表 1205 大腿骨近位部骨折の既往 治療方法(新分類)別(透析患者全体)

治療方法 (新分類)	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
施設血液透析	178,612	9,157	187,769	380	60,576	248,725
(%)	(95.1)	(4.9)	(100.0)			
Off-line HDF	3,690	229	3,919	11	1,402	5,332
(%)	(94.2)	(5.8)	(100.0)			
On-line HDF	31,920	1,228	33,148	31	11,348	44,527
(%)	(96.3)	(3.7)	(100.0)			
Push/Pull HDF	75	6	81		29	110
(%)	(92.6)	(7.4)	(100.0)			
ハイオフィльтраーション	193	14	207	1	59	267
(%)	(93.2)	(6.8)	(100.0)			
IHDF	2,639	128	2,767	1	772	3,540
(%)	(95.4)	(4.6)	(100.0)			
血液濾過	10	1	11		5	16
(%)	(90.9)	(9.1)	(100.0)			
血液吸着透析 (リクセル等使用)	1,038	105	1,143	2	231	1,376
(%)	(90.8)	(9.2)	(100.0)			
在宅血液透析	391	6	397		158	555
(%)	(98.5)	(1.5)	(100.0)			
腹膜透析 (CAPD)	3,023	84	3,107	7	1,788	4,902
(%)	(97.3)	(2.7)	(100.0)			
腹膜透析 (APD)	1,833	47	1,880	8	887	2,775
(%)	(97.5)	(2.5)	(100.0)			
腹膜透析 (CCPD)	748	6	754	1	337	1,092
(%)	(99.2)	(0.8)	(100.0)			
合計	224,172	11,011	235,183	442	77,592	313,217
(%)	(95.3)	(4.7)	(100.0)			
記載なし						
(%)						
総計	224,172	11,011	235,183	442	77,592	313,217
(%)	(95.3)	(4.7)	(100.0)			

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

*腹膜透析(CCPD)は、APDと手動のバック交換の両方を行うもの

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査