

表 1206 大腿骨近位部骨折の既往 併用の状況別（透析患者全体）

併用の状況	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
HD(F)単独	218,346	10,868	229,214	426	74,523	304,163
(%)	(95.3)	(4.7)	(100.0)			
PD単独	4,411	121	4,532	14	2,558	7,104
(%)	(97.3)	(2.7)	(100.0)			
HD(F)単独.PDカテ あり	141	5	146		36	182
(%)	(96.6)	(3.4)	(100.0)			
PD.HD併用週1 HD(F)	1,045	16	1,061	2	407	1,470
(%)	(98.5)	(1.5)	(100.0)			
PD.HD併用週2 HD(F)	128		128		44	172
(%)	(100.0)		(100.0)			
PD.HD併用週3 HD(F)	22	1	23		6	29
(%)	(95.7)	(4.3)	(100.0)			
PD.HD併用週4 HD(F)						
(%)						
PD.HD併用その他	55		55		16	71
(%)	(100.0)		(100.0)			
合計	224,148	11,011	235,159	442	77,590	313,191
(%)	(95.3)	(4.7)	(100.0)			
不明	24		24		1	25
(%)	(100.0)		(100.0)			
記載なし					1	1
(%)						
総計	224,172	11,011	235,183	442	77,592	313,217
(%)	(95.3)	(4.7)	(100.0)			

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査