

表 1208 大腿骨近位部骨折の既往 年齢(歳)別 (透析患者全体)

年齢	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
15歳未満 (%)	69 (100.0)		69 (100.0)		34	103
15歳～ (%)	706 (99.0)	7 (1.0)	713 (100.0)	1	256	970
30歳～ (%)	10,315 (98.9)	117 (1.1)	10,432 (100.0)	15	3,409	13,856
45歳～ (%)	41,417 (98.1)	805 (1.9)	42,222 (100.0)	79	14,040	56,341
60歳～ (%)	102,473 (96.3)	3,959 (3.7)	106,432 (100.0)	177	35,025	141,634
75歳～ (%)	65,599 (92.2)	5,518 (7.8)	71,117 (100.0)	162	23,469	94,748
90歳～ (%)	3,592 (85.6)	605 (14.4)	4,197 (100.0)	8	1,355	5,560
合計 (%)	224,171 (95.3)	11,011 (4.7)	235,182 (100.0)	442	77,588	313,212
不明 (%)					4	4
記載なし (%)	1 (100.0)		1 (100.0)			1
総計 (%)	224,172 (95.3)	11,011 (4.7)	235,183 (100.0)	442	77,592	313,217
平均	67.53	74.80	67.87	68.85	67.83	67.86
標準偏差	12.47	10.78	12.49	12.84	12.49	12.49

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査