

表 1209 大腿骨近位部骨折の既往 透析歴(年)別 (透析患者全体)

透析歴	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
2年未満 (%)	50,145 (96.9)	1,621 (3.1)	51,766 (100.0)	133	17,480	69,379
2年～ (%)	56,006 (95.6)	2,597 (4.4)	58,603 (100.0)	93	19,942	78,638
5年～ (%)	55,468 (94.6)	3,188 (5.4)	58,656 (100.0)	90	19,055	77,801
10年～ (%)	28,647 (94.4)	1,714 (5.6)	30,361 (100.0)	68	9,631	40,060
15年～ (%)	15,640 (95.4)	750 (4.6)	16,390 (100.0)	16	5,149	21,555
20年～ (%)	8,741 (95.6)	400 (4.4)	9,141 (100.0)	26	2,864	12,031
25年～ (%)	4,799 (94.7)	268 (5.3)	5,067 (100.0)	9	1,654	6,730
30年～ (%)	2,807 (93.2)	206 (6.8)	3,013 (100.0)	3	901	3,917
35年～ (%)	1,432 (89.2)	173 (10.8)	1,605 (100.0)	2	489	2,096
40年～ (%)	409 (83.5)	81 (16.5)	490 (100.0)		127	617
合計 (%)	224,094 (95.3)	10,998 (4.7)	235,092 (100.0)	440	77,292	312,824
不明 (%)	77 (85.6)	13 (14.4)	90 (100.0)	2	300	392
記載なし (%)	1 (100.0)		1 (100.0)			1
総計 (%)	224,172 (95.3)	11,011 (4.7)	235,183 (100.0)	442	77,592	313,217
平均	7.31	8.62	7.37	6.70	7.15	7.31
標準偏差	7.54	8.40	7.59	7.35	7.45	7.55

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査