

表 1238 大腿骨近位部骨折の既往 年齢(歳)別 (施設血液透析患者 透析回数週3回)

年齢	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
15歳未満 (%)	6 (100.0)	6 (100.0)	6 (100.0)		4	10
15歳～ (%)	460 (98.7)	6 (1.3)	466 (100.0)	1	110	577
30歳～ (%)	7,186 (98.8)	88 (1.2)	7,274 (100.0)	11	1,719	9,004
45歳～ (%)	29,732 (98.0)	596 (2.0)	30,328 (100.0)	64	7,178	37,570
60歳～ (%)	78,651 (96.3)	3,036 (3.7)	81,687 (100.0)	150	19,105	100,942
75歳～ (%)	53,331 (92.2)	4,495 (7.8)	57,826 (100.0)	132	13,607	71,565
90歳～ (%)	2,911 (85.7)	486 (14.3)	3,397 (100.0)	6	777	4,180
合計 (%)	172,277 (95.2)	8,707 (4.8)	180,984 (100.0)	364	42,500	223,848
不明 (%)					3	3
記載なし (%)	1 (100.0)		1 (100.0)			1
総計 (%)	172,278 (95.2)	8,707 (4.8)	180,985 (100.0)	364	42,503	223,852
平均	68.16	75.14	68.49	68.85	68.46	68.49
標準偏差	12.28	10.66	12.30	12.74	12.26	12.29

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査