

表 1239 大腿骨近位部骨折の既往 透析歴(年)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

透析歴	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
2年未満 (%)	39,838 (96.8)	1,312 (3.2)	41,150 (100.0)	113	9,607	50,870
2年～ (%)	43,626 (95.4)	2,096 (4.6)	45,722 (100.0)	71	11,062	56,855
5年～ (%)	43,436 (94.4)	2,598 (5.6)	46,034 (100.0)	79	10,710	56,823
10年～ (%)	22,076 (94.1)	1,379 (5.9)	23,455 (100.0)	56	5,382	28,893
15年～ (%)	11,582 (95.2)	590 (4.8)	12,172 (100.0)	12	2,758	14,942
20年～ (%)	6,047 (95.4)	289 (4.6)	6,336 (100.0)	21	1,421	7,778
25年～ (%)	3,017 (94.5)	174 (5.5)	3,191 (100.0)	8	785	3,984
30年～ (%)	1,618 (92.7)	127 (7.3)	1,745 (100.0)	2	367	2,114
35年～ (%)	786 (89.9)	88 (10.1)	874 (100.0)	1	195	1,070
40年～ (%)	202 (82.1)	44 (17.9)	246 (100.0)		39	285
合計 (%)	172,228 (95.2)	8,697 (4.8)	180,925 (100.0)	363	42,326	223,614
不明 (%)	49 (83.1)	10 (16.9)	59 (100.0)	1	177	237
記載なし (%)	1 (100.0)		1 (100.0)			1
総計 (%)	172,278 (95.2)	8,707 (4.8)	180,985 (100.0)	364	42,503	223,852
平均	6.93	8.11	6.98	6.58	6.87	6.96
標準偏差	7.09	7.71	7.12	7.21	7.01	7.10

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査