

表 1286 大腿骨近位部骨折の既往 原疾患別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

原疾患	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
慢性糸球体腎炎	13,545	500	14,045	11	3,406	17,462
(%)	(96.4)	(3.6)	(100.0)			
慢性腎盂腎炎	376	17	393		91	484
(%)	(95.7)	(4.3)	(100.0)			
急速進行性糸球体腎炎	286	9	295		58	353
(%)	(96.9)	(3.1)	(100.0)			
妊娠腎/妊娠中毒症	281	16	297	2	102	401
(%)	(94.6)	(5.4)	(100.0)			
その他の分類不能の腎炎	193	8	201		60	261
(%)	(96.0)	(4.0)	(100.0)			
多発性嚢胞腎	1,465	45	1,510	2	368	1,880
(%)	(97.0)	(3.0)	(100.0)			
腎硬化症	2,874	144	3,018	4	798	3,820
(%)	(95.2)	(4.8)	(100.0)			
悪性高血圧	305	12	317		74	391
(%)	(96.2)	(3.8)	(100.0)			
糖尿病性腎症	12,750	580	13,330	13	3,617	16,960
(%)	(95.6)	(4.4)	(100.0)			
SLE腎炎	336	24	360	1	65	426
(%)	(93.3)	(6.7)	(100.0)			
アミロイド腎	63	3	66		8	74
(%)	(95.5)	(4.5)	(100.0)			
痛風腎	129	4	133		33	166
(%)	(97.0)	(3.0)	(100.0)			
先天性代謝異常による腎不全	32	1	33		16	49
(%)	(97.0)	(3.0)	(100.0)			
腎・尿路結核	25		25		6	31
(%)	(100.0)		(100.0)			
腎・尿路結石	59	6	65		14	79
(%)	(90.8)	(9.2)	(100.0)			
腎・尿路腫瘍	101		101		18	119
(%)	(100.0)		(100.0)			
閉塞性尿路障害	83	1	84		20	104
(%)	(98.8)	(1.2)	(100.0)			
骨髄腫	23	2	25	1	7	33
(%)	(92.0)	(8.0)	(100.0)			
腎形成不全	109	2	111		25	136
(%)	(98.2)	(1.8)	(100.0)			
不明	3,398	135	3,533	2	1,168	4,703
(%)	(96.2)	(3.8)	(100.0)			
再導入	378	17	395	1	87	483
(%)	(95.7)	(4.3)	(100.0)			
その他	857	38	895	5	260	1,160
(%)	(95.8)	(4.2)	(100.0)			
合計	37,668	1,564	39,232	42	10,301	49,575
(%)	(96.0)	(4.0)	(100.0)			
記載なし	6		6			6
(%)	(100.0)		(100.0)			
総計	37,674	1,564	39,238	42	10,301	49,581
(%)	(96.0)	(4.0)	(100.0)			

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査