

表 1287 大腿骨近位部骨折の既往 医療機関別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

医療機関	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
国公立大学	41	2	43		6	49
(%)	(95.3)	(4.7)	(100.0)			
私立大学	107	5	112	2	61	175
(%)	(95.5)	(4.5)	(100.0)			
国立	50	1	51			51
(%)	(98.0)	(2.0)	(100.0)			
県市町村立	1,453	70	1,523	9	583	2,115
(%)	(95.4)	(4.6)	(100.0)			
社会保険	354	16	370		43	413
(%)	(95.7)	(4.3)	(100.0)			
厚生連	654	28	682		340	1,022
(%)	(95.9)	(4.1)	(100.0)			
その他公的	602	21	623	2	229	854
(%)	(96.6)	(3.4)	(100.0)			
私立総合	1,097	51	1,148		94	1,242
(%)	(95.6)	(4.4)	(100.0)			
私立	9,353	525	9,878	23	2,353	12,254
(%)	(94.7)	(5.3)	(100.0)			
私立診療所	23,963	845	24,808	6	6,592	31,406
(%)	(96.6)	(3.4)	(100.0)			
総計	37,674	1,564	39,238	42	10,301	49,581
(%)	(96.0)	(4.0)	(100.0)			

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査