

表 1330 大腿骨近位部骨折の既往 年齢(歳)別 (腹膜透析患者)

年齢	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
15歳未満 (%)	60 (100.0)		60 (100.0)		29	89
15歳～ (%)	65 (100.0)		65 (100.0)		36	101
30歳～ (%)	411 (99.8)	1 (0.2)	412 (100.0)	2	246	660
45歳～ (%)	1,492 (98.9)	17 (1.1)	1,509 (100.0)	3	808	2,320
60歳～ (%)	2,467 (97.9)	52 (2.1)	2,519 (100.0)	7	1,297	3,823
75歳～ (%)	1,036 (94.6)	59 (5.4)	1,095 (100.0)	4	550	1,649
90歳～ (%)	73 (90.1)	8 (9.9)	81 (100.0)		46	127
合計 (%)	5,604 (97.6)	137 (2.4)	5,741 (100.0)	16	3,012	8,769
不明 (%)						
記載なし (%)						
総計 (%)	5,604 (97.6)	137 (2.4)	5,741 (100.0)	16	3,012	8,769
平均	62.71	72.62	62.94	65.44	62.51	62.80
標準偏差	14.54	11.50	14.55	14.27	14.63	14.58

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査