

表 1331 大腿骨近位部骨折の既往 透析歴(年)別（腹膜透析患者）

透析歴	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
2年未満 (%)	2,372 (97.9)	50 (2.1)	2,422 (100.0)	6	1,252	3,680
2年～ (%)	1,942 (97.2)	56 (2.8)	1,998 (100.0)	8	1,096	3,102
5年～ (%)	985 (97.7)	23 (2.3)	1,008 (100.0)	2	510	1,520
10年～ (%)	214 (98.6)	3 (1.4)	217 (100.0)		97	314
15年～ (%)	58 (98.3)	1 (1.7)	59 (100.0)		28	87
20年～ (%)	16 (88.9)	2 (11.1)	18 (100.0)		8	26
25年～ (%)	7 (87.5)	1 (12.5)	8 (100.0)		4	12
30年～ (%)	2 (66.7)	1 (33.3)	3 (100.0)		3	6
35年～ (%)	2 (100.0)		2 (100.0)			2
40年～ (%)	2 (100.0)		2 (100.0)			2
合計 (%)	5,600 (97.6)	137 (2.4)	5,737 (100.0)	16	2,998	8,751
不明 (%)	4 (100.0)		4 (100.0)		14	18
記載なし (%)						
総計 (%)	5,604 (97.6)	137 (2.4)	5,741 (100.0)	16	3,012	8,769
平均	3.02	3.42	3.03	2.81	2.92	2.99
標準偏差	3.61	4.78	3.64	2.37	3.39	3.55

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査